



Акушерство и гинекология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 10.10.2026, 02:17 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИНФИЦИРОВАНИЯ БРЮШИНЫ РАЗЛИЧАЮТ ПЕРИТОНИТ

- 1 стертый и классический
- 2 распространенный и разлитой
- 3 отграниченный и диффузный

4 **первичный и вторичный**

Правильный ответ: 4 - первичный и вторичный

Вопрос 2

К ПРОТИВПОКАЗАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ НАЛИЧИЕ

- 1 аномальных цитологических результатов мазков
- 2 расхождения результатов цитологического метода исследования и расширенной кольпоскопии
- 3 выраженных изменений при расширенной кольпоскопии
- 4 **вагинита, цервицита, инфекций, передаваемых половым путём (ИППП)**

Правильный ответ: 4 - вагинита, цервицита, инфекций, передаваемых половым путём (ИППП)

Вопрос 3

ПЕРЕХОД С ИНЪЕКЦИОННОГО ПРЕПАРАТА НА КОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1 после 7-дневного перерыва
- 2 после окончания менструальноподобной реакции
- 3 **в день очередной инъекции**
- 4 в первый день менструальноподобной реакции

Правильный ответ: 3 - в день очередной инъекции

Вопрос 4

НАИМЕНЬШЕЙ СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЛАДАЮТ

- 1 ознобы
- 2 эпизоды ночной потливости
- 3 приливы жара

4 **приступы тахикардии**

Правильный ответ: 4 - приступы тахикардии

Вопрос 5

У СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕВОЧКИ В РОССИИ _____ (ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ) ПРИХОДИТ В 12-13 ЛЕТ

- 1 пубертат
- 2 спермархе
- 3 адренархе

4 менархе

Правильный ответ: 4 - менархе

Вопрос 6

ДЛЯ НАРУШЕННОЙ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ ТРУБНОГО АБОРТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1 периодически повторяющаяся боль внизу живота**
- 2 быстрое развитие геморрагического шока II-III степени
- 3 невозможность выполнения органосохраняющей операции на маточной трубе
- 4 острый приступ боли с кратковременной потерей сознания

Правильный ответ: 1 - периодически повторяющаяся боль внизу живота

Вопрос 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗАЛЬНОЙ ЛИНИИ ЗАТРУДНЕНО ПРИ СОСТОЯНИИ ПЛОДА

- 1 активное бодрствование**
- 2 глубокий сон
- 3 период покоя
- 4 активный сон

Правильный ответ: 1 - активное бодрствование

Вопрос 8

ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1 физиотерапия
- 2 оперативное вмешательство**
- 3 антибактериальная терапия
- 4 гормональная терапия

Правильный ответ: 2 - оперативное вмешательство

Вопрос 9

КЛЕТКИ КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМ

- 1 энтодермы
- 2 эктодермы
- 3 трофэктодермы

4 мезодермы

Правильный ответ: 4 - мезодермы

Вопрос 10

ВДКН, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДЕФИЦИТОМ 21-ГИДРОКСИЛАЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ ОБУСЛОВЛЕНА ПЕРЕНОСОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕАКТИВНОМ ПСЕВДОГЕНЕ CYP21A1P В УЧАСТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО CYP21A2

- 1 отсутствием фенотип-генотипической корреляции и часто
- 2 наличием фенотип-генотипической корреляции и часто
- 3 отсутствием фенотип-генотипической корреляции и редко
- 4 наличием фенотип-генотипической корреляции и редко

Правильный ответ: 2 - наличием фенотип-генотипической корреляции и часто