

Тесты | Высшее образование | Акушерство и гинекология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Акушерство и гинекология | Записей: 10

1 Вопрос

АМНИОЦЕНТЕЗ ОПТИМАЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ (В НЕДЕЛЯХ)

1. 13-14
2. 21-22
3. 10-12
4. 16-20

Правильный ответ: 16-20

2 Вопрос

ОСТРЫЙ ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ БЕРЕМЕННЫХ РАЗВИВАЕТСЯ В

1. III триместре беременности
2. II триместре беременности
3. I триместре беременности
4. раннем послеродовом периоде

Правильный ответ: III триместре беременности

3 Вопрос

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ К ПРИЕМУ РАЗРЕШЕНЫ

1. инсулины
2. ингибиторы ДПП-4
3. препараты сульфаниламочевины
4. ингибиторы натрий-глюкозотранспортера 2 типа

Правильный ответ: инсулины

4 Вопрос

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ НАРУЖНОМ ПОВОРОТЕ ПЛОДА СЛЕДУЕТ

1. операцию продолжить через 20 минут
2. вскрыть плодный пузырь
3. операцию прекратить
4. приступить к родовозбуждению

Правильный ответ: операцию прекратить

5 Вопрос

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. явления дисменореи
2. нарушения функции соседних органов

3. ациклические маточные кровотечения

4. слизисто-гнойные выделения

Правильный ответ: ациклические маточные кровотечения

6 Вопрос

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ _____ ТЕРАПИИ

1. седативной
- 2. гормональной**
3. растительной
4. общеукрепляющей

Правильный ответ: гормональной

7 Вопрос

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОВУЛЯТОРНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРЕДСТАВЛЕНЫ

1. секреторной трансформацией под влиянием эстрогенов
2. регенерацией функционального слоя под влиянием прогестерона

3. пролиферативными изменениями в фолликулярную фазу

4. десквамацией после наступления овуляции

Правильный ответ: пролиферативными изменениями в фолликулярную фазу

8 Вопрос

КОРДОЦЕНТЕЗ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ (В НЕДЕЛЯХ)

1. 15-17
2. 10-12
- 3. 20-22**
4. 5-7

Правильный ответ: 20-22

9 Вопрос

МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПУНКЦИИ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. тампонада влагалища после пункции
2. профилактический прием антикоагулянтов
3. аспирация максимального числа фолликулов

4. снижение числа проколов влагалища

Правильный ответ: снижение числа проколов влагалища

10 Вопрос

ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ГОЛОВКА ПЛОДА РОЖДАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

1. средним косым
- 2. малым косым**
3. прямым
4. большим косым

Правильный ответ: малым косым