



Аллергология и иммунология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 10.10.2026, 02:10 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

12 вопросов · Аллергология и иммунология · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Мама мальчика 8 месяцев обратилась к врачу – аллергологу-иммунологу.

1.2. Жалобы

На высыпания на коже.

1.3. Анамнез заболевания

- С 6 месяцев жизни беспокоят периодически возникающие единичные высыпания на лице и разгибательных поверхностях конечностей;
- Температура тела оставалась в пределах нормы;
- Проводилось лечение средствами с увлажняющим действием – без эффекта

1.4. Анамнез жизни

- Ребенок от 3 беременности, протекавшей без особенностей, 3 физиологических родов в срок.
- Профилактические прививки проводились согласно Национальному календарю.
- Наследственный анамнез – отягощен: у отца пищевая аллергия; у матери – поллиноз.
- Находится на грудном вскармливании.
- Прикорм введен с 6 месяцев (молочные каши).

1.5. Объективный статус

- Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 36,7°C. Активный, аппетит сохранен.
- Кожные покровы умеренно сухие.
- Высыпания локализованы на щеках единичными бледными папулами.

1. План обследования

Вопрос 1

Необходимыми для постановки диагноза методами диагностики являются

- 1 диагностическая элиминационная диета**
- 2 исследование крови на определение уровня общего IgE
- 3 исследование кала на углеводы
- 4 диагностическое введение продукта**
- 5 «слепая» провокационная проба с пищевым продуктом
- 6 открытая провокационная проба с пищевым продуктом

Правильные ответы:

1 - диагностическая элиминационная диета

4 - диагностическое введение продукта

ОБОСНОВАНИЕ

Диагностическая элиминационная диета является универсальным методом, позволяющим подтвердить диагноз как при IgE-опосредованных, так и при не-IgE-опосредованных формах пищевой аллергии. При наличии клинически значимых симптомов и высокой вероятности аллергии к определенному белку, назначается диагностическая элиминационная диета с исключением продуктов, содержащих данный белок (при грудном вскармливании такие продукты исключаются из рациона матери).

Клинические рекомендации Союза педиатров России,

Пищевая аллергия,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года),

(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D)

Стр. 16, раздел 2.4. Иная диагностика.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Пищевая аллергия, 2018 г.

Рекомендовано диагностическое введение продукта.

(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D)

При диагностическом введении продукта количество продукта, содержащего подозреваемый причинно-значимый аллерген, для первого пробного введения определяется исходя из данных анамнеза (количество продукта, на которое отмечалась реакция, выраженность реакции на это количество). Начинают с дозы, значительно меньшей той, которая вызвала реакцию. Срок наблюдения за реакцией после диагностического введения продукта зависит также от характера предыдущих реакций на этот продукт и составляет от 2 часов при реакциях немедленного типа до 2 суток при реакциях замедленного типа 17 в анамнезе.

Клинические рекомендации Союза педиатров России,

Пищевая аллергия,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 16, раздел 2.4. Иная диагностика.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Пищевая аллергия, 2018 г.

3. Результаты обследования

3.1. Диагностическая элиминационная диета

После исключения на 1 месяц из рациона матери и ребенка продуктов питания, содержащих белки коровьего молока, новых высыпаний на коже не отмечалось.

3.2. Диагностическое введение продукта

После употребления мамой сыра и последующего кормления ребенка грудью, в течение 3 часов вновь появились высыпания на щеках и разгибательных поверхностях конечностей

3.5. Исследование крови на определение уровня общего IgE

Результат отрицательный

3.6. Исследование кала на углеводы

Результат отрицательный

2. Диагноз

Вопрос 2

Учитывая данные анамнеза, физикального осмотра и результатов исследований, больному можно поставить диагноз

- 1 Атопический дерматит, распространенная форма, тяжелое течение, стадия обострения. Пищевая аллергия (аллергия на белок коровьего молока и белок куриного яйца)
- 2 **Атопический дерматит, распространенная форма, среднетяжелое течение, подострая стадия. Пищевая аллергия (аллергия на белок коровьего молока)**
- 3 Пищевая аллергия неуточненная
- 4 Непереносимость лактозы

Правильный ответ:

2 - Атопический дерматит, распространенная форма, среднетяжелое течение, подострая стадия. Пищевая аллергия (аллергия на белок коровьего молока)

ОБОСНОВАНИЕ

На основании данных анамнеза и физикального осмотра: отягощённая наследственность по аллергическим заболеваниям, в течение 2 месяцев высыпания эритематозно-папулезного характера (без повышения температуры тела) с локализацией на коже щёк и внутренних поверхностях локтевых сгибов, отсутствие новых высыпаний на безмолочной диете и обострения кожного процесса (после употребления мамой молочного продукта) можно поставить диагноз: Атопический дерматит, распространенная форма, среднетяжелое течение, подострая форма. Пищевая аллергия (аллергия на белок коровьего молока).

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Пищевая аллергия,
МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1,
Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)
Стр. 10, раздел 1.2. Этиология и патогенез.
Клинические рекомендации Союза педиатров России. Пищевая аллергия, 2018 г.

5. Диагноз

5.1. Атопический дерматит, распространенная форма, среднетяжелое течение, подострая стадия. Пищевая аллергия (аллергия на белок коровьего молока)

3. Лечение

Вопрос 3

Этиологическое лечение данного пациента включает

- 1 исключение из питания матери и ребенка мяса говядины и продуктов, содержащих белки коровьего молока**
- 2 перевод ребенка на смешанное вскармливание: сохранение грудного вскармливания и докорм ребенка стандартной адаптированной смесью на основе козьего молока
- 3 перевод ребенка на искусственное вскармливание адаптированной гипоаллергенной смесью на основе коровьего молока
- 4 добавление в грудное молоко лактазы

Правильный ответ:

1 - исключение из питания матери и ребенка мяса говядины и продуктов, содержащих белки коровьего молока

ОБОСНОВАНИЕ

Этиологическое лечение при аллергии к белкам коровьего молока подразумевает исключение из питания больного всех продуктов, содержащих белки коровьего молока, говядины (а также телятины). (Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D)

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Аллергия к белкам коровьего молока у детей,
МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,
Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)
Стр. 16: Приложение Б4. Диетотерапия при ПА у детей раннего возраста, находящихся на грудном вскармливании.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Пищевая аллергия, 2018 г.

Вопрос 4

Минимальный срок назначения безмолочной диеты составляет ____ месяцев

- 1 7
- 2 6
- 3 9
- 4 8

Правильный ответ:
2 - 6

ОБОСНОВАНИЕ

Минимальные сроки исключения из питания рекомендованы международными документами, и составляют не менее 6 месяцев. (Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D).

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Аллергия к белкам коровьего молока у детей,
МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,
Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)
стр. 16, раздел 6.1. Исходы и прогноз.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018

Вопрос 5

Проведение вакцинации ребенку с аллергией к белку коровьего молока в периоде ремиссии и подострой фазы происходит соответственно срокам

- 1 элиминационной диеты, проводимой у ребенка
- 2 национального календаря профилактических прививок
- 3 календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
- 4 прорезывания зубов

Правильный ответ:
2 - национального календаря профилактических прививок

ОБОСНОВАНИЕ

Аллергия у ребенка является поводом для отвода от прививок только до окончания острых проявлений. Таких детей прививают на фоне полной или неполной ремиссии, в том числе на фоне усиления специфической терапии: противогистаминных препаратов и бронходилататоров за 5-7 дней до прививки и в течение 1-2 нед. после нее.

Таточенко В.К., Озерецковский Н.А. Иммунопрофилактика-2018. Справочник. 13-е изд., расш. — М.: Боргес; 2018. — 274 с., глава 4.3. Вакцинация лиц с хронической патологией, стр. 181.

Вопрос 6

Для купирования зуда данному ребенку необходимо назначить антигистаминный препарат

- 1 дифенгидрамин
- 2 хлоропирамин
- 3 фексофенадин

4 **цетиризин**

Правильный ответ:
4 - цетиризин

ОБОСНОВАНИЕ

Применение антигистаминных препаратов II поколения при аллергии к белкам коровьего молока рекомендовано для купирования нежизнеугрожающих проявлений. Цетиризин (код АТХ: R06AE07) назначается детям в возрасте от 6 до 12 месяцев.

(Сила рекомендаций – III; достоверность доказательств – C)

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Аллергия к белкам коровьего молока у детей,
МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,
Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 18, раздел 3.1. Консервативное лечение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018

Вопрос 7

При среднетяжелой форме атопического дерматита средствами первой линии для наружной терапии являются

- 1 препараты на основе ихтиола
- 2 ингибиторы кальциневрина
- 3 увлажняющие крема

4 **местные глюкокортикостероиды**

Правильный ответ:
4 - местные глюкокортикостероиды

ОБОСНОВАНИЕ

Местные глюкокортикостероиды рекомендуются как средства первой линии для лечения обострений атопического дерматита, а также препараты стартовой терапии при среднетяжелой и тяжелой формах заболевания. (Сила рекомендации 1; уровень достоверности доказательств – A)

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

Вопрос 8

Введение продуктов прикорма в рамках «окна толерантности» производится в возрасте _____ месяцев

- 1 8-12
- 2 4-6
- 3 6-8
- 4 2-4

Правильный ответ:
2 - 4-6

ОБОСНОВАНИЕ

Введение продуктов прикорма в рамках «окна толерантности» - в возрасте 4-6 месяцев способствует снижению риска развития атопии в последующие годы.

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Аллергия к белкам коровьего молока у детей,
МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,
Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 20, раздел 5. Профилактика и диспансерное наблюдение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018

Вопрос 9

Первичная профилактика аллергии к белкам коровьего молока (профилактика раннего дебюта атопии) включает

- 1 применение матерью антигистаминных препаратов до и в течение беременности
- 2 искусственное вскармливание с 4 месяцев жизни
- 3 соблюдение безлактозной диеты матери в течение беременности
- 4 **исключительно грудное вскармливание до возраста 4-6 месяцев**

Правильный ответ:
4 - исключительно грудное вскармливание до возраста 4-6 месяцев

ОБОСНОВАНИЕ

У детей из группы высокого риска, т.е. имеющих наследственную отягощенность по атопическим заболеваниям, определенным превентивным эффектом обладает исключительно грудное вскармливание до возраста 4-6 месяцев. В периоде кормления грудью матерям из «группы риска» целесообразно сформировать полноценный разнообразный рацион с ограниченным использованием в питании наиболее распространенных аллергенов, в том числе продуктов, содержащих белки коровьего молока.

Клинические рекомендации Союза педиатров России,
Аллергия к белкам коровьего молока у детей,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 19-20, раздел 5. Профилактика и диспансерное наблюдение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018

Вопрос 10

Принцип постепенного расширения рациона детям с высоким риском развития атопии подразумевает введение не более ____ продукта/ов в неделю

1 4

2 3

3 1

4 2

Правильный ответ:

3 - 1

ОБОСНОВАНИЕ

Ключевым правилом введения прикорма детям с высоким риском развития атопии является назначение монокомпонентных продуктов, а также соблюдение принципа постепенного расширения рациона (не более 1 продукта в неделю).

Клинические рекомендации Союза педиатров России,

Пищевая аллергия,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 22, раздел 5. Профилактика и диспансерное наблюдение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Пищевая аллергия, 2018 г.

4. Вариатив

Вопрос 11

Детям с аллергией к белкам коровьего молока, находящимся на искусственном вскармливании, рекомендовано использовать в питании

- 1 напитки из сои, риса, овса, миндаля, кокоса или каштана
- 2 смеси на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислот
- 3 цельное козье молоко
- 4 смеси и продукты на основе немодифицированных (негидролизированных) белков молока - козьего, овечьего, верблюжьего и других видов млекопитающих

Правильный ответ:

2 - смеси на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислот

ОБОСНОВАНИЕ

Детям с аллергией к белкам коровьего молока, находящимся на искусственном вскармливании, рекомендовано использовать в питании специализированные смеси на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислот.

(Сила рекомендаций – I; достоверность доказательств – A) Клинические рекомендации Союза педиатров России

Аллергия к белкам коровьего молока у детей,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 17, раздел 3.1. Консервативное лечение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018

Вопрос 12

При назначении смеси на основе высокогидролизованного молочного белка детям с аллергией к белкам коровьего молока, находящимся на искусственном вскармливании, оценку эффективности диеты проводят через ____ неделю/недель/недели

- 1 5
- 2 3
- 3 2
- 4 4

Правильный ответ:

3 - 2

ОБОСНОВАНИЕ

Если при приеме смеси на основе высокогидролизованного белка состояние не улучшается в течение 2 недель, рекомендуется перевод на питание на основе аминокислот.

Клинические рекомендации Союза педиатров России,

Аллергия к белкам коровьего молока у детей,

МКБ 10: L20.8/L27.2/ K52.2 /T78.1/78.4/78.8,

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Стр. 17, раздел 3.1. Консервативное лечение.

Клинические рекомендации Союза педиатров России. Аллергия к белкам коровьего молока у детей, 2018