



Анестезиология-реаниматология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 29.08.2026, 02:23 МСК · База обновлена: 29.08.2026, 02:16 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Анестезиология-реаниматология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Молодой человек 25 лет поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии без сознания в сопровождении родителей. Не реагирует на обращенную речь.

1.2. Жалобы

Собрать не удастся

1.3. Анамнез заболевания

Был обнаружен родителями дома без сознания, не реагировал на оклик и раздражители. Отмечалась выраженная бледность и редкое дыхание. Была вызвана бригада скорой помощи, доставившая пациента в больницу.

1.4. Анамнез жизни

Со слов родителей, хроническими заболеваниями не страдает. Регулярно проводит время с друзьями в ночных клубах. В последнее время отмечалось нетипичное поведение, скрытность в отношении друзей и личной жизни.

Также последнюю неделю отмечал повышение температуры тела до 38,0°C по вечерам при отсутствии признаков респираторного заболевания.

Аллергические реакции не отмечались.

Профессиональных вредностей не имеет.

1.5. Объективный статус

Рост 192 см, вес 80 кг.

Состояние тяжелое. На вопросы не отвечает, не реагирует на раздражители. Оценка по шкале комы Глазго = 3 балла.

Температура тела 38,5°C. Двусторонний миоз. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь.

Визуально отмечаются несколько кровоподтеков и макулопапулезная сыпь на медиальной поверхности левого предплечья.

Дыхание самостоятельное, поверхностное, проводится во все отделы легких, хрипов нет. ЧДД 10/мин, без участия вспомогательной мускулатуры. $SpO_2 = 91\%$ при дыхании воздухом.

Систолический шум в точке выслушивания трикуспидального клапана (регургитация).

АД = 110/60 (ср. АД 76) мм рт. ст. ЧСС 50 уд/мин. На мониторе ЭКГ брадикардия.

Живот мягкий.

Показатели глюкометрии 4,5 ммоль.

1. Диагноз

Вопрос 1.

Учитывая данные анамнеза, наиболее вероятным предварительным диагнозом является

1. Внутреннее кровотечение
2. Острое нарушение мозгового кровообращения
3. Спонтанный пневмоторакс
4. Острая наркотическая интоксикация

Правильный ответ:

4 - Острая наркотическая интоксикация

Основу диагностики составляют симптомы, выявляемые при осмотре. Визуальный осмотр включает оценку размера зрачка, уровня изменения сознания, цвета и влажности кожных покровов и слизистых. Именно три симптома визуальной оценки состояния больного – размер зрачка, уровень изменения сознания, и состояние кожных покровов и слизистых – являются отправной точкой для диагностики. Миоз с угнетением сознания, бледность кожи, брадикардия, гипотония, брадикардия характерны для отравления опиатами.

Федеральные клинические рекомендации Ассоциации клинических токсикологов. Отравление наркотиками и психодислептиками. 2018 г.

(1)

Гипертермия может возникнуть в результате развития у пациента аспирационной пневмонии и наличия инфекционных осложнений, таких как эндокардит. Обследование кожи может позволить определить наличие инъекционных воздействий, самых доступных знаков, свидетельствующих о наличии в анамнезе хронического потребления наркотических препаратов.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

2. План обследования

Вопрос 2.

Необходимыми лабораторными исследованиями у данного пациента являются

- ① микробиологический посев крови
- ② общий анализ мочи
- ③ биохимический анализ крови
- 4. коагулограмма
- ⑤ анализ мочи на токсические вещества
- ⑥ газовый состав крови

Правильные ответы:

- 1 - микробиологический посев крови
- 2 - общий анализ мочи
- 3 - биохимический анализ крови
- 5 - анализ мочи на токсические вещества
- 6 - газовый состав крови

Рекомендуется выполнение как минимум 2 посевов крови у пациентов с риском развития инфекционного эндокардита: пациентам с врожденными и приобретенными аномалиями развития, раннее перенесенным ИЭ, с протезами клапанов сердца, иммунодефицитным статусом или инъекционным наркоманом, имеющим лихорадку неясного генеза более 48 часов.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Рекомендуется лабораторная диагностика у пациентов с подозрением на употребление наркотических препаратов. У пациентов, у которых точно выявлены симптомы отравления, либо, наоборот, выявляется клиника без наличия четкого анамнеза, должен быть обязательно выполнен общий анализ мочи.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Рекомендуется лабораторная диагностика у пациентов с подозрением на употребление наркотических препаратов. У пациентов, у которых точно выявлены симптомы отравления, либо, наоборот, выявляется клиника без наличия чёткого анамнеза, должны обязательно выполнены сывороточные электролиты, мочевины и креатинин. Измерение осмоляльности сыворотки, содержание кетонов, амилазы, кальция, магния, а также исследование функции печени должны быть обязательно выполнены у данной категории лиц.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Рекомендуется лабораторная диагностика у пациентов с подозрением на употребление наркотических препаратов. Должен быть в обязательном порядке проведён анализ мочи на токсические препараты при подозрении на отравление.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Рекомендуется лабораторная диагностика у пациентов с подозрением на употребление наркотических препаратов. Напряжение газов артериальной крови, лактат представляют собой параметры, необходимые для пациентов с наличием сердечно-сосудистых, неврологических, респираторных и кислотно-основных нарушений.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 3.

Строго необходимым инструментальным исследованием у данного пациента при поступлении является

1. фиброгастродуоденоскопия
2. рентгенография легких
3. электрокардиограмма
4. УЗИ брюшной полости

Правильный ответ:
3 - электрокардиограмма

Рекомендуется запись ЭКГ у пациентов с признаками злоупотребления наркотическими препаратами.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 4.

Необходимым дополнительным инструментальным обследованием для данного пациента является

1. УЗДГ нижних конечностей
2. эхокардиография

3. компьютерная томография головного мозга
4. компьютерная томография груди

Правильный ответ:
2 - эхокардиография

Степень вероятности возникновения септического эндокардита у лиц, пользующихся нестерильными шприцами (при наркомании) в 30 раз выше.

Инфекционный эндокардит. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2016

(1)

При подозрении на инфекционный эндокардит рекомендуется выполнение ЭхоКГ для выявления вегетаций. Необходима эхокардиографическая оценка гемодинамической характеристики патологии клапанного аппарата, оценка функции желудочков и давления в легочной артерии, выявление осложнений.

(1)

3. Лечение

Вопрос 5.

Неотложными мероприятиями у данного пациента являются инсуфляция кислорода через лицевую маску и внутривенное введение

1. налоксона
2. цефтриаксона
3. морфина
4. гентамицина

Правильный ответ:
1 - налоксона

В случае подозрения острой наркотической интоксикации необходимо внутривенное введение 0,05-2,0 мг налоксона. Целью введения налоксона является обеспечение адекватной вентиляции.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 6.

Длительность действия налоксона при в/в введении составляет

1. 45-90 мин
2. 4-6 часа
3. 15-20 мин
4. 12-14 часов

Правильный ответ:
1 - 45-90 мин

Действие налоксона длится всего 45-90 мин, поэтому для поддержания эффекта требуется повторение болюса.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 7.

После применения налоксона следует внимательно наблюдать за состоянием пациента для своевременной диагностики осложнений, одним из которых является

1. лейкопения
2. синдром отмены опиоидов
3. олигурия
4. анафилактический шок

Правильный ответ:
2 - синдром отмены опиоидов

Следует с осторожностью относиться к потенциально серьезным побочным эффектам налоксона, которые включают отек легких, судороги и возникновение синдрома отмены опиоидов.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 8.

Через час после начала интенсивной терапии у пациента начались судорожные подергивания мышц конечностей. Препаратом первой группы, необходимым для купирования возникшего состояния, является

1. пропофол
2. сибазон
3. тиопентал натрия
4. галоперидол

Правильный ответ:
2 - сибазон

Препаратами первой группы для купирования судорожного синдрома должны быть бензодиазепины, второй - барбитураты.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 9.

Через несколько часов пациент пришел в сознание, однако сразу стал агрессивным, начал кричать, пытаться встать с кровати, жаловался на нестерпимую боль в мышцах и требовал ввести ему дозу героина. Препаратами для купирования синдрома отмены являются

1. налоксон
2. парацетамол
3. морфин
4. клофелин
5. метадон

Правильные ответы:

4 - клофелин

5 - метадон

6 - дексмететомидин

Пациентам с синдромом «отмены» легкой или средней степени тяжести можно применять клофелин, который также уменьшает симптомы отмены опиоидов, в особенности симптомы, связанные с вегетативной дисфункцией. Стандартные дозы клофелина, используемые для лечения синдрома «отмены», могут варьировать от 0,1 до 0,2 мг внутрь каждые 6 ч. Снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений являются маркерами адекватного воздействия препарата. При отсутствии снижения боли и гемодинамической реакции дозу клофелина изменяют. Лицам с тяжелой степенью зависимости может потребоваться 2-4 мкг/кг в течение 5-10 мин внутривенно для получения заметного эффекта.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Общие принципы, касающиеся ведения пациентов с синдромом «отмены» заключается в постепенном снижении дозы опиатов и разработке индивидуального плана их отмены. Стартовая доза метадона составляет 20 мг перорально или 10 мг подкожно/внутримышечно, или 1,25 мг внутривенно методом титрования (каждые 5-10 мин) до уменьшения или купирования абстинентного синдрома. Для пациентов, имеющих более выраженную опиоидную зависимость, требуются для лечения более высокие дозы метадона (30 мг).

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Другие альфа-2-агонисты, такие как дексмететомидин, также используются для лечения абстинентного синдрома.

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 10.

Спустя еще 2 часа состояние стабилизировалось на фоне терапии метадоном. Больной в сознании, на вопросы отвечает осознанно. Жалоб не предъявляет. На следующие сутки следует

1. отменить введение метадона
2. снизить дозировку метадона на 20%
3. оставить дозировку метадона прежней
4. снизить дозировку метадона на 50%

Правильный ответ:

2 - снизить дозировку метадона на 20%

После стабилизации состояния ежедневную дозу метадона уменьшают на 20% от предыдущей в день (для стационарных больных).

Периоперационное ведение пациентов с наркотической зависимостью. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018

(1)

Вопрос 11.

В качестве антибактериальной терапии осложнений, развившихся у пациента, следует начать в/в введение

1. цетриаксона
2. ванкомицина
3. гентамицина
4. бензилпенициллина

Правильный ответ:
2 - ванкомицина

Для терапии инфекционного эндокардита непротезированного клапана, вызванного оксациллиноустойчивыми штаммами стафилококков рекомендуется ванкомицин (30 мг/кг/сут в/в в 2 введения).

Инфекционный эндокардит. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2016

(1)

Вопрос 12.

Продолжительность антибактериальной терапии должна составлять (в неделях)

1. 4
2. 8
3. 2
4. 6

Правильный ответ:
4 - 6

Продолжительность терапии инфекционного эндокардита непротезированного клапана, вызванного оксациллиноустойчивыми штаммами стафилококков, продолжается 6 недель.

Инфекционный эндокардит. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2016

(1)