

Тесты | Высшее образование | Анестезиология-реаниматология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Анестезиология-реаниматология |
Записей: 10

1 Вопрос

ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВНУТРИВЕННО ВВОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ КАРДИОДЕПРЕССИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

1. кетамин

2. тиопентал

3. диазепам

4. пропофол

Правильный ответ: тиопентал

2 Вопрос

ОСНОВНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. кальций

2. железо

3. натрий

4. калий

Правильный ответ: натрий

3 Вопрос

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БОЛЬНОМУ, ПЕРЕНЕСШЕМУ ГЕМОДИАЛИЗ, НЕ ПРОВОДЯТ

1. контроль и коррекцию гемоглобина

2. гепаринизацию артерио-венозного шунта

3. охлаждение живота

4. форсированный диурез

Правильный ответ: гепаринизацию артерио-венозного шунта

4 Вопрос

ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАПАДЕНИЯ ЯЗЫКА ВО ВРЕМЯ МАСОЧНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. использование языкодержателя

2. подъем головного конца операционного стола

3. поворот головы в сторону

4. введение воздуховода

Правильный ответ: введение воздуховода

5 Вопрос

НИЗКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕКРУТИРОВАНИЯ АЛЬВЕОЛ ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ ХАРАКТЕРЕН ПРИ

- 1. прямом повреждении лёгких**
2. высоком давлении в пищеводе
3. нормальной податливости грудной клетки
4. индексе внесосудистой воды в легких 8 мл/кг

Правильный ответ: прямом повреждении лёгких

6 Вопрос

ПРИ _____ К СИМПТОМАМ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1. высокой кишечной непроходимости
- 2. низкой кишечной непроходимости**
3. омфалоцеле
4. гастрошизисе

Правильный ответ: низкой кишечной непроходимости

7 Вопрос

БОЛЕВЫМ ПОРОГОМ СЧИТАЮТ

1. наибольшую интенсивность болевого ощущения, которую больной способен вынести
2. наименьшую интенсивность болевого ощущения, которую больной способен вынести
- 3. наименьшую интенсивность раздражения, которая воспринимается больным как болевое ощущение**
4. наибольшую интенсивность раздражения, которая воспринимается больным как болевое ощущение

Правильный ответ: наименьшую интенсивность раздражения, которая воспринимается больным как болевое ощущение

8 Вопрос

ШКАЛА MODS ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

1. острых и хронических функциональных изменений
- 2. полиорганной недостаточности**
3. органной дисфункции
4. риска смерти у детей

Правильный ответ: полиорганной недостаточности

9 Вопрос

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. диазепам
- 2. пропофол**
3. тиопентал натрия
4. мидазолам

Правильный ответ: пропофол

10 Вопрос

ГИПОДИНАМИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

1. гиповолемии
- 2. снижении насосной функции миокарда**
3. повышении периферического сосудистого сопротивления
4. снижении тонуса сосудов

Правильный ответ: снижении насосной функции миокарда