



Челюстно-лицевая хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 28.08.2026, 03:24 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 20:41 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ АНГУЛЯРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ

1. кверху и вперед
2. книзу и кзади
3. медиально и вперед
4. латерально и кверху

Правильный ответ: 2 - книзу и кзади

Вопрос 2

К ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ ОТНОСЯТ

1. периостит
2. травматический остеомиелит
3. фурункулез
4. рожистое воспаление

Правильный ответ: 2 - травматический остеомиелит

Вопрос 3

ПРИ ВТОРИЧНО-ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПРАВОГО ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ПОДБОРОДКА

1. смещена влево
2. не определяется
3. не смещена
4. смещена вправо

Правильный ответ: 4 - смещена вправо

Вопрос 4

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФАНТИЛЬНОЙ ГЕАНГИОМЫ ПОКАЗАНО ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ

1. дезагрегантов
2. гормонов
3. антибиотиков
4. антипиретиков

Правильный ответ: 3 - антибиотиков

Вопрос 5

ЛЕЧЕНИЕ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

1. только хирургическим методом
2. физиотерапевтическим лечением

3. консервативно-хирургическим методом
4. только консервативным методом

Правильный ответ: 1 - только хирургическим методом

Вопрос 6

В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ У РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ КАЗАБАХА-МЕРРИТТА ВЫЯВЛЯЕТСЯ

1. диспротеинемия
2. гипоальбуминемия
3. увеличение уровня глюкозы
4. снижение уровня фибриногена

Правильный ответ: 4 - снижение уровня фибриногена

Вопрос 7

СИНОНИМОМ ГЛОБУЛОМАКСИЛЛЯРНОЙ КИСТЫ ЯВЛЯЕТСЯ КИСТА

1. резцового канала
2. шаровидно-верхнечелюстная
3. носогубная
4. носоальвеолярная

Правильный ответ: 2 - шаровидно-верхнечелюстная

Вопрос 8

ОСТРЫЙ АРТРИТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

1. переломом мышцелкового отростка нижней челюсти
2. околоушным гипергидрозом
3. острым гайморитом
4. переломом верхней челюсти

Правильный ответ: 1 - переломом мышцелкового отростка нижней челюсти

Вопрос 9

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ И РАБОТАЕТ НА ОСНОВАНИИ

1. наличия лицензии по экспертизе профессиональной пригодности
2. приказа руководителя медицинской организации
3. постановления органов местного самоуправления
4. распоряжения органа исполнительной власти субъекта Федерации

Правильный ответ: 2 - приказа руководителя медицинской организации

Вопрос 10

К ЛОКАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ИНФАНТИЛЬНОЙ ГЕАНГИОМОЙ (ГИПЕРПЛАЗИЕЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ) ОТНОСИТСЯ

1. применение гормональной терапии
- ② оперативное удаление образования
3. применение рекомбинантного интерферона
4. применение цитостатиков

Правильный ответ: 2 - оперативное удаление образования