



## Детская эндокринология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 29.08.2026, 03:00 МСК · База обновлена: 29.08.2026, 02:58 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА ПРИ МЭН 1 ЯВЛЯЮТСЯ

1. полиурия, полидипсия, запах ацетона изо рта, «липкая» моча, постоянное чувство голода, резкое снижение веса, мышечная слабость, фолликулит
2. избыток веса, гипертермия, гиперпигментация кожи шеи и подмышечных впадин, ярко-розовые стрии, артериальная гипертензия, избыточное развитие жировой клетчатки в верхней части туловища, адинамия
3. боль в костях, переломы, нарушение походки, мышечная слабость, появление крови в моче, запоры, тошнота, депрессия, анорексия, снижение веса, артериальная гипертензия, аритмии
4. судороги, потеря сознания, жидкий стул, тахикардия, постоянное чувство голода, снижение веса, ощущение страха, гипервозбудимость, тремор, гипотензия

**Правильный ответ: 3 - боль в костях, переломы, нарушение походки, мышечная слабость, появление крови в моче, запоры, тошнота, депрессия, анорексия, снижение веса, артериальная гипертензия, аритмии**

## Вопрос 2

ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РОСТА РЕБЕНКА РЕФЕРЕНСНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА И ПОЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ

1. коэффициент стандартного отклонения
2. коэффициент «верхний сегмент/ нижний сегмент»
3. скорость роста
4. целевой рост

**Правильный ответ: 1 - коэффициент стандартного отклонения**

## Вопрос 3

С ЦЕЛЬЮ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭКТОПИРОВАННОЙ ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АБСОЛЮТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

1. ультразвуковое исследование
2. компьютерная томография
3. магнитно-резонансная томография
4. сцинтиграфия с  $^{99}\text{Tc}$  или  $^{123}\text{I}$

**Правильный ответ: 4 - сцинтиграфия с  $^{99}\text{Tc}$  или  $^{123}\text{I}$**

## Вопрос 4

НАСТУПЛЕНИЕ ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У МАЛЬЧИКОВ НАЧИНАЕТСЯ С

1. мутации голоса
2. увеличения полового члена в длину
3. пигментации мошонки
4. увеличения яичек

**Правильный ответ: 4 - увеличения яичек**

## Вопрос 5

КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ОТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1. 6,5
- 2. 6,1
- 3. 5,7
- 4. 7,0

**Правильный ответ: 1 - 6,5**

## Вопрос 6

КЛАССИЧЕСКИЕ РАХИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКЕЛЕТА ВКЛЮЧАЮТ

- 1. гипертрофию лобных бугров, «четки» на ребрах, Х-образные деформации ног
- 2. деформацию бедренных костей по типу «пастушьего посоха», микрогнатию
- 3. сколиоз, выраженный поясничный лордоз, плоско-вальгусные стопы
- 4. укорочение верхних и нижних конечностей, микроцефалию

**Правильный ответ: 1 - гипертрофию лобных бугров, «четки» на ребрах, Х-образные деформации ног**

## Вопрос 7

ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБУСЛОВЛЕНО

- 1. физиологическим течением пубертата
- 2. психическими заболеваниями
- 3. приемом лекарственных препаратов
- 4. избыточным поступлением калорий

**Правильный ответ: 4 - избыточным поступлением калорий**

## Вопрос 8

ДЛЯ ГИПОГОНАДИЗМА ПРИ СИНДРОМЕ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА ХАРАКТЕРНЫ

- 1. низкие показатели ЛГ и ФСГ, низкий уровень эстрадиола
- 2. высокие показатели ЛГ и ФСГ, низкий уровень эстрадиола
- 3. высокие показатели ЛГ и ФСГ, нормальный уровень эстрадиола
- 4. любые значения ЛГ и ФСГ, низкий уровень эстрадиола

**Правильный ответ: 2 - высокие показатели ЛГ и ФСГ, низкий уровень эстрадиола**

## Вопрос 9

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ГИПОГЛИКЕМИИ У РЕБЕНКА 6 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ РЕКОМЕНДОВАНО ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА

- 1. кортизол
- 2. тестостерон
- 3. альдостерон
- 4. ТТГ

**Правильный ответ: 1 - кортизол**

### Вопрос 10

ПРОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ FISH ПОКАЗАНО ПРИ КАРИОТИПЕ

1. 45,XO/46,XX
- 2 45,XO/46,X, +mar
3. 45,XO/46,XY
4. 46,X,r(X)

**Правильный ответ: 2 - 45,XO/46,X, +mar**