

Тесты | Высшее образование | Детская хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Детская хирургия | Записей: 10

1 Вопрос

К ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧЕК ОТНОСИТСЯ

1. L-образная почка
2. подковообразная почка

3. поликистоз

4. гомолатеральная дистопия

Правильный ответ: поликистоз

2 Вопрос

ВЕДУЩИМ МАРКЕРОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ШВАННОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. эпителиальный мембранный антиген
2. CD 21 церезит
3. цитокератин

4. протеин С 100

Правильный ответ: протеин С 100

3 Вопрос

СМЕЩЕНИЕ СРЕДОСТЕНИЯ В БОЛЬНУЮ СТОРОНУ НАБЛЮДАЮТ ПРИ

1. пиотораксе
- 2. ателектазе доли лёгкого**
3. диафрагмально-плевральной грыже
4. пневмотораксе

Правильный ответ: ателектазе доли лёгкого

4 Вопрос

ПАЛЬЦЕВОЕ РЕКТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОХОДИМОСТИ И СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ НА (В ДНЯХ)

1. 28-30
2. 7-8

3. 10-14

4. 15-18

Правильный ответ: 10-14

5 Вопрос

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ИСХОДЕ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОЖНО СУДИТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ

1. 2 лет
2. 5 лет

3. 6 месяцев

4. 1 года

Правильный ответ: 6 месяцев

6 Вопрос

БЕЗРАБОТНОМУ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. выдаётся в случае госпитализации
2. выдаётся только при ургентном заболевании

3. не выдаётся

4. выдаётся при наличии у него документа о постановке на учёт по безработице

Правильный ответ: не выдаётся

7 Вопрос

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

1. ущемленной паховой грыжей
- 2. почечной коликой**
3. острым калькулезным холециститом
4. гломерулонефритом

Правильный ответ: почечной коликой

8 Вопрос

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМА СХЕМА

1. Путти
- 2. Рейнберга**
3. Хильгенрейнера
4. Омбредана

Правильный ответ: Рейнберга

9 Вопрос

СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГЕМАТОМЫ СЕЛЕЗЕНКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫМ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. затенение левой фланковой области за счет выпота в брюшную полость
- 2. смещение кишечных петель вправо в прямой проекции**

3. уменьшение размера селезенки

4. смещение кишечных петель кпереди в боковой проекции

Правильный ответ: смещение кишечных петель вправо в прямой проекции

10 Вопрос

РАЗВИТИЕ ОТСРОЧЕННОЙ ФОРМЫ РАННЕЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ СПУСТЯ (В НЕДЕЛЯХ)

1. 5-7

2. 1-2

3. 3-4

4. 8-9

Правильный ответ: 3-4