

Тесты | Высшее образование | Детская урология-андрология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Детская урология-андрология |
Записей: 10

1 Вопрос

ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА С КИСТОЙ СЕМЕННОГО КАНАТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ

1. наблюдение в динамике
2. гормональное лечение
3. экстренное оперативное вмешательство

4. оперативное лечение в плановом порядке

Правильный ответ: оперативное лечение в плановом порядке

2 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КАМНЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. экскреторная урография
2. цистография

3. цистоскопия

4. УЗИ мочевого пузыря

Правильный ответ: цистоскопия

3 Вопрос

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ С ВВЕДЕНИЕМ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ

1. уретрография
2. урофлоуметрия

3. цистоуретрография

4. цистоскопия

Правильный ответ: цистоуретрография

4 Вопрос

СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК ИМЕЕТ ____ ЧАСТЬ

1. промежностную
2. уретральную

3. тазовую

4. надлобковую

Правильный ответ: тазовую

5 Вопрос

МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТОТАЛЬНОЙ ЭПИСПАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. уретропластика с созданием сфинктера мочевого пузыря из окружающей скелетной мускулатуры
2. создание искусственной уретры достаточного диаметра и длины
3. устранение недержания мочи путем создания механического препятствия
- 4. уретропластика с созданием сфинктера мочевого пузыря из местных тканей**

Правильный ответ: уретропластика с созданием сфинктера мочевого пузыря из местных тканей

6 Вопрос

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКТИВНОЙ ФАЗЫ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ЦЕФТРИАКСОН ДЕТЕМ СТАРШЕ 2 НЕДЕЛЬ НАЗНАЧАЕТСЯ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (В МГ/КГ)

- 1. 20-80**
2. 100-150
3. 20-30
4. 30-50

Правильный ответ: 20-80

7 Вопрос

В ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ ПРИ КОРАЛЛОВИДНОМ КАМНЕ ПОЧКИ И ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

1. внутривенное введение плазмы за 2 дня до операции
- 2. применение цефалоспоринов внутримышечно за 2-3 дня до операции**
3. применение сульфаниламидов, нитрофуранов за 2 недели до операции
4. капельное орошение лоханки раствором антибиотиков по катетеру за 2-3 дня до операции

Правильный ответ: применение цефалоспоринов внутримышечно за 2-3 дня до операции

8 Вопрос

ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1. урографии
- 2. урофлоуметрии**
3. пиелографии
4. нефросцинтиграфии

Правильный ответ: урофлоуметрии

9 Вопрос

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

1. компьютерной томографии с контрастным усилением
2. статической нефросцинтиграфии

3. микционной уретроцистографии

4. комплексного ультразвукового исследования

Правильный ответ: микционной уретроцистографии

10 Вопрос

НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА НАЗЫВАЕТСЯ

1. паховой
2. тазовой
3. канатиковой

4. яичковой

Правильный ответ: яичковой