

Тесты | Высшее образование | Эндокринология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Эндокринология | Записей: 10

1 Вопрос

ПОКАЗАНИЕМ К КАРИОТИПИРОВАНИЮ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА В ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гипергонадотропная форма аменореи

- 2. высокорослость при отсутствии в семье родственников высокого роста
- 3. сочетание артериальной гипертензии и образования надпочечника
- 4. наличие случаев медуллярного рака в семье

Правильный ответ: гипергонадотропная форма аменореи

2 Вопрос

ОДНИМ ИЗ СИМПТОМОВ МАКРОПРОЛАКТИНОМЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1. отвращение к пище
- 2. повышенная потливость
- 3. сужение полей зрения**
- 4. нарушение ритма сон-бодрствование

Правильный ответ: сужение полей зрения

3 Вопрос

ПРЕПАРАТ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1. форсига
- 2. фемостон
- 3. форстео**
- 4. флоринеф

Правильный ответ: форстео

4 Вопрос

К МАКРОАДЕНОМАМ НАДПОЧЕЧНИКОВ ОТНОСЯТ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЕЕ ____ СМ В ДИАМЕТРЕ

- 1. 3
- 2. 0,5
- 3. 1**
- 4. 2

Правильный ответ: 1

5 Вопрос

ДЛЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНЫ

1. низкий ТТГ и низкий уровень св.Т4
2. повышенный ТТГ и низкий уровень св.Т4
3. нормальный ТТГ и нормальный уровень св.Т4

4. повышенный ТТГ и нормальный уровень св.Т4

Правильный ответ: повышенный ТТГ и нормальный уровень св.Т4

6 Вопрос

СКРИНИНГ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПЕРЕЛОМОВ РЕКОМЕНДОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ _____ СРЕДИ ВСЕХ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ И МУЖЧИН СТАРШЕ 50 ЛЕТ

1. рентгенографии
2. биохимического анализа крови

3. алгоритма FRAX

4. денситометрии

Правильный ответ: алгоритма FRAX

7 Вопрос

ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВОЗРАСТОМ 18-65 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ММ РТ.СТ.

1. $\geq 110 < 120 / \geq 65 < 70$
- 2. $\geq 120 < 130 / \geq 70 < 80$**
3. $\geq 140 < 150 / \geq 80 < 85$
4. $\geq 130 < 140 / \geq 70 < 80$

Правильный ответ: $\geq 120 < 130 / \geq 70 < 80$

8 Вопрос

ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ С ПЕРОРАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. лираглутид
2. ситаглиптин
3. эмпаглифлозин

4. сибутрамин

Правильный ответ: сибутрамин

9 Вопрос

ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ АДРЕНАЛЭКТОМИИ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СИНДРОМ

1. Конна
- 2. Нельсона**
3. Шихана

4. Кальмана

Правильный ответ: Нельсона

10 Вопрос

ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФИЦИТА ЙОДА ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

1. фолликулярного рака
- 2. узлового коллоидного зоба**
3. болезни Грейвса
4. подострого тиреоидита

Правильный ответ: узлового коллоидного зоба