



Физическая и реабилитационная медицина

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 27.08.2026, 23:35 МСК · База обновлена: 22.08.2026, 19:56 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Физическая и реабилитационная медицина

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Мужчина 45 лет госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с подозрением острый холецистит. Направлен гастроэнтерологом к физиотерапевту с диагнозом острый холецистит. Шкала реабилитационной маршрутизации 2.

1.2. Жалобы

На тупые ноющие боли в области правого подреберья, которые обычно возникают через 1-3 ч после приема обильной, особенно жирной пищи. Боль иррадирует в область правого плеча и шею. Боль усиливается при физической нагрузке.

1.3. Анамнез заболевания

Считает себя больным в течение 2 недель. Лечится у терапевта по месту жительства. Лечение в амбулаторных условиях без выраженного эффекта. Получает лечение в отделении гастроэнтерологии.

1.4. Анамнез жизни

- * курит, алкоголем не злоупотребляет
- * профессиональных вредностей не имеет
- * аллергической реакции нет

1.5. Объективный статус

Состояние удовлетворительное. Рост 189 см. Вес 98 кг, t 36.6⁰C.

Правильного телосложения, умеренного питания. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные ЧСС 76 в мин. АД 120/85 мм рт. ст. Живот мягкий. Печень, селезенка не увеличены. Стул учащен, оформлен, диурез в норме.

1. Лечение

Вопрос 1.

Пациенту показано назначение

1. инфузионной терапии
2. физиотерапии
3. применение глюкокортикостероидов с целью купирования болевого синдрома
4. применение нестероидных противовоспалительных препаратов с целью купирования болевого синдрома

Правильный ответ:

2 - физиотерапии

При составлении плана комплексного лечения включение физиотерапии позволяет с учетом индивидуальных особенностей назначить метод и методику проведения процедуры с лекарственным средством непосредственно на проекцию болевого синдрома, избежать характерных местных и общих осложнений, связанных с пероральным приемом препаратов.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 318

Вопрос 2.

Вегетокоррегирующим методом лечения является

1. криотерапия
2. транскраниальная электростимуляция
3. сантиметроволновая терапия
4. ультравысокочастотная терапия

Правильный ответ:

2 - транскраниальная электростимуляция

Вегетокоррегирующим методом лечения является транскраниальная электростимуляция.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 3.

Процедуру проводят с частотой

1. 1 раза в день
2. 1 раз в неделю
3. 2 раза в неделю
4. 4 раза в неделю

Правильный ответ:

1 - 1 раза в день

Процедуру проводят ежедневно.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 4.

На курс лечения применяются ____ процедур

1. 10
2. 7-8
3. 1-5
4. 15

Правильный ответ:

1 - 10

Курс лечения составляет 10 процедур.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 5.

Процедуру можно повторить через ____ месяц(-а, -ев)

1. 6

2. 8

3 2

4. 1

Правильный ответ:

3 - 2

Повторный курс возможен через 2 месяца.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 6.

Продолжительность данной процедуры составляет ____ минут

1 20-40

2. 10-15

3. 45

4. 50-60

Правильный ответ:

1 - 20-40

Продолжительность транскраниальной электростимуляции составляет 20-40 минут.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 7.

Сила тока при проведении данной процедуры до появления

1 ощущений покалывания под электродами

2. невыносимого тепла под электродами

3. сильного тепла под электродами

4. ощущений зуда под электродами

Правильный ответ:

1 - ощущений покалывания под электродами

Сила тока при проведении данной процедуры до появления ощущений покалывания.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 8.

Длительность импульсов при проведении данной процедуры составляет ____ мс

1 3-3,5

2. 1-1,5

3. 4-4,5

4. 2-2,5

Правильный ответ:

1 - 3-3,5

Длительность импульсов при проведении транскраниальной электростимуляции составляет 3-3,5 мс.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 9.

С седативной целью при данном диагнозе назначается процедура

1. пелоидотерапии
2. электросонтерапии
3. короткоимпульсной электроанальгезии
4. радоновых ванн

Правильный ответ:

2 - электросонтерапии

Электросонтерапия обладает седативным эффектом.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 10.

Процедуру проводят с частотой

1. 2 раза в неделю
2. 1 раз в неделю
3. 1 раз в день
4. 2 раза в день

Правильный ответ:

3 - 1 раз в день

Процедуру электросонтерапии проводят ежедневно.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 11.

На курс лечения применяется _____ процедур

1. 10-15
2. 7-8
3. 20-25
4. 30-35

Правильный ответ:

1 - 10-15

Курс лечения электросонотерапии составляет 10-15 процедур.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 319

Вопрос 12.

К критериям эффективности проводимой терапии относят

- 1** исчезновение болей в правом подреберье
- 2. нормализацию УЗИ картины
- 3. нормализацию клинических показателей крови
- 4. нормализацию биохимических показателей крови

Правильный ответ:

1 - исчезновение болей в правом подреберье

Критерий эффективности при холецистите является исчезновение болей в правом подреберье.

Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -688 с. – (Серия «Национальные руководства»). С. 320