

Тесты | Высшее образование | Фтизиатрия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Фтизиатрия | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ КОМПЛЕКСЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПАРАСПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ВИДЕ

1. ринита, синусита, тонзиллита
2. пневмонии, хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы

3. кератоконъюнктивита, блефарита, узловой эритемы

4. плеврита, перитонита, перикардита

Правильный ответ: кератоконъюнктивита, блефарита, узловой эритемы

2 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ И УСТОЙЧИВЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ЦИРРОТИЧЕСКОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. приступообразный кашель

2. одышка

3. боль в грудной клетке
4. повышение температуры тела

Правильный ответ: одышка

3 Вопрос

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕМЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА «ТИПА ПЕНКОСТА» ДЛЯ ОПУХОЛИ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. самый ранний и постоянный симптом - нарушение глотания
2. отсутствие синдрома Горнера и постоянных болевых ощущений
3. расположение округлого фокуса в средних или нижних отделах легкого

4. переход процесса с плевры на нервное плечевое сплетение

Правильный ответ: переход процесса с плевры на нервное плечевое сплетение

4 Вопрос

В ТЕСТ-СИСТЕМЕ «ТУБИНФЕРОН» В ОТЛИЧИЕ ОТ КВАНТИФЕРОНОВОГО ТЕСТА ВМЕСТО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО МИТОГЕНА ИСПОЛЬЗУЮТ

1. антигены вакцинного штамма БЦЖ
2. корд-фактор МБТ

3. туберкулин

4. специфический иммуноглобулин G

Правильный ответ: туберкулин

5 Вопрос

ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРИКОЖНЫХ ПРОБ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. карантин по детским инфекциям в детских коллективах**
2. туберкулезное инфицирование
3. туберкулез в прошлом
4. предшествующая положительная реакция на туберкулин

Правильный ответ: карантин по детским инфекциям в детских коллективах

6 Вопрос

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА НЕОБХОДИМА ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ

1. изониазида
2. рифампицина
3. пиразинамида
- 4. этамбутола**

Правильный ответ: этамбутола

7 Вопрос

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ПРИ ПОДОСТРОМ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1. субфебрильная**
2. в пределах нормы
3. гектическая
4. фебрильная

Правильный ответ: субфебрильная

8 Вопрос

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ПЛЕВРИТ ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЁЗА, ПРИ КОТОРОЙ

1. имеется экссудат в плевральных полостях при наличии диссеминации в лёгких
2. определяется накопление транссудата в плевральной полости при отсутствии рентгенологически видимых изменений в лёгких и внутригрудных лимфатических узлах
3. имеется воспаление плевры и накопление экссудата в плевральной полости при наличии увеличенных внутригрудных лимфатических узлов
- 4. имеется воспаление плевры, накопление экссудата в плевральной полости при отсутствии рентгенологически видимых изменений в лёгких и внутригрудных лимфатических узлах**

Правильный ответ: имеется воспаление плевры, накопление экссудата в плевральной полости при отсутствии рентгенологически видимых изменений в лёгких и внутригрудных лимфатических узлах

9 Вопрос

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФАЗЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПО IV СТАНДАРТНОМУ РЕЖИМУ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОЦЕССАХ БЕЗ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

1. 5
2. 4
3. 2
- 4. 3**

Правильный ответ: 3

10 Вопрос

БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛФК СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ УПРАЖНЕНИЙ

1. на расслабление мышечных групп
2. дыхательной гимнастики
- 3. с большой амплитудой движения головы**
4. на тренировку равновесия

Правильный ответ: с большой амплитудой движения головы