

Тесты | Высшее образование | Гематология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Гематология | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ТЕРАПИИ В-ЛИНЕЙНОГО ОЛЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНОТУЗУМАБА ОЗОГАМИЦИНА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО КЛЕТОК, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ ТАРГЕТИРУЕМЫЙ АНТИГЕН, НО И

1. **среднее количество молекул антигена на клетку**
2. экспрессию CD19
3. степень гетерогенности популяции по экспрессии антигена
4. способность клетки к эндоцитозу

Правильный ответ: среднее количество молекул антигена на клетку

2 Вопрос

ПРИЧИНОЙ АПЛАСТИЧЕСКИХ КРИЗОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОЛИЗОМ, КАК ПРАВИЛО, СЛУЖИТ

1. вирус Herpes Zoster
2. **парвовирус В19**
3. вирус цитомегалии
4. вирус простого герпеса I-II типа

Правильный ответ: парвовирус В19

3 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ И РЕКОМЕНДУЕМЫМ ТЕСТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ

1. реакция конглоутинации с желатином
2. двухэтапная проба в пробирках с антиглобулином
3. реакция агглютинации на плоскости
4. **непрямая проба Кумбса**

Правильный ответ: непрямая проба Кумбса

4 Вопрос

ДЛЯ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. **высокопоточные мембранные массообменные устройства**
2. супервысокопоточные мембранные массообменные устройства
3. низкопоточные мембранные массообменные устройства
4. гемосорбенты

Правильный ответ: высокопоточные мембранные массообменные устройства

5 Вопрос

ПРИ ЭКСТИРПАЦИИ ПСЕВДООПУХОЛИ РАСЧЕТНАЯ ДОЗА ФАКТОРА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО УРОВЕНЬ ФАКТОРА В КРОВИ ПАЦИЕНТА НЕ НИЖЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1. 100**
2. 120
3. 20
4. 50

Правильный ответ: 100

6 Вопрос

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ОТНОСЯТСЯ К

1. нарушениям вторичного гемостаза
- 2. нарушениям первичного гемостаза**
3. тромбофилиям
4. тромбастениям

Правильный ответ: нарушениям первичного гемостаза

7 Вопрос

К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ ПРИОБРЕТЕННОГО ДЕФИЦИТА АНТИТРОМБИНА ОТНОСЯТ

1. применение таких препаратов, как циклофосфан, тетрациклин и преднизолон
2. повышенное потребление (массивный тромбоз, ДВС-синдром, сепсис, инфекция, РДС)
- 3. нарушение синтеза при печеночной недостаточности**
4. формирование ингибитора к антитромбину

Правильный ответ: нарушение синтеза при печеночной недостаточности

8 Вопрос

ПРИ ЦИЛИНДРОВОЙ НЕФРОПАТИИ И ОСТРОМ ПОЧЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

1. бета-адреноблокаторы
2. антибиотики
3. блокаторы медленных кальциевых каналов
- 4. нестероидные противовоспалительные препараты**

Правильный ответ: нестероидные противовоспалительные препараты

9 Вопрос

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ С СИНДРОМОМ ЖИЛЬБЕРА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА ЗА СЧЕТ НЕПРЯМОЙ ФРАКЦИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ

- 1. нилотиниба**

2. иматиниба
3. гидроксимочевина
4. цитарабина

Правильный ответ: нилотиниба

10 Вопрос

ЭКСПРЕССИЯ CD13 ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ ПРИ В-ЛИНЕЙНОМ ОЛЛ

1. часто ассоциирована с образованием химерного генаETV6-RUNX1
2. часто ассоциирована с наличием перестроек генаMYC
3. часто ассоциирована с образованием химерного генаBCR-ABL1
- 4. не ассоциирована с определенными генетическими нарушениями**

Правильный ответ: не ассоциирована с определенными генетическими нарушениями