

Тесты | Высшее образование | Кардиология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Кардиология | Записей: 10

1 Вопрос

ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННУМУ СТЕНТИРОВАНИЮ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. прогрессирующая стенокардия
2. стабильная стенокардия III ФК

3. острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST

4. вазоспастическая стенокардия

Правильный ответ: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST

2 Вопрос

К МАЛЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ КРИТЕРИЯМ КИСЕЛЯ-ДЖОНСА ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ ОТНОСЯТ

1. тромбоцитопению
2. повышение ревматоидного фактора

3. повышение СОЭ и СРБ

4. лейкоцитоз

Правильный ответ: повышение СОЭ и СРБ

3 Вопрос

ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

1. бета-блокаторы

2. блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда
3. ингибиторы АПФ
4. диуретики

Правильный ответ: бета-блокаторы

4 Вопрос

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ II ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СООТВЕТСТВУЮТ АНГИНОЗНЫЕ ПРИСТУПЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ

1. при ходьбе на расстояние 100 - 200 м в обычном темпе

2. при ускоренной ходьбе, подъеме по лестнице на 2 этаж, в холодную погоду или эмоциональном стрессе

3. в покое
4. при очень быстрой ходьбе, беге

Правильный ответ: при ускоренной ходьбе, подъеме по лестнице на 2 этаж, в холодную погоду или эмоциональном стрессе

5 Вопрос

МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЁМОМ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЁН С ПОМОЩЬЮ РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА И ДЕФЕКТА ПЕРФУЗИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. объём поражения миокарда более 1 г
- 2. объём поражения миокарда более 10 г**
3. локальное поражение, составляющее 20% толщины стенки левого желудочка
4. трансмуральное поражение миокарда

Правильный ответ: объём поражения миокарда более 10 г

6 Вопрос

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ (ОТНОСИТЕЛЬНОЙ) ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. тяжёлая лёгочная гипертензия**
2. ревматизм
3. пролабирование створок трикуспидального клапана
4. инфекционный эндокардит

Правильный ответ: тяжёлая лёгочная гипертензия

7 Вопрос

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРОНАРОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. состояние после острого нарушения мозгового кровообращения
2. вирусный гепатит С в анамнезе
- 3. непереносимость контрастного вещества**
4. высокий класс стенокардии

Правильный ответ: непереносимость контрастного вещества

8 Вопрос

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕРАПИИ ПРИ РАЗВИТИИ ВТОРИЧНОГО АЛЬДОСТЕРОНИЗМА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИМЕНЯЮТ

1. кислые пищевые продукты
2. внутривенную инфузию калия хлорида
- 3. верошпирон**
4. комбинацию фуросемида с гипотиазидом

Правильный ответ: верошпирон

9 Вопрос

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. эритроцитоз

2. острая почечная недостаточность

3. гипокалиемию

4. вторичный гиперальдостеронизм

Правильный ответ: острая почечная недостаточность

10 Вопрос

К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ I «С» ПОДКЛАССА ОТНОСЯТ

1. амиодарон

2. дизопирамид

3. лидокаин

4. этализин

Правильный ответ: этализин