

Тесты | Высшее образование | Общая врачебная практика (семейная медицина)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Общая врачебная практика (семейная медицина) | Записей: 10

1 Вопрос

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ____ НЕДЕЛЬ

- 1. 2
- 2. 3
- 3. 4
- 4. 6

Правильный ответ: 6

2 Вопрос

В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ОМС ВХОДЯТ

- 1. медицинские организации, оказывающие услуги из средств ОМС
- 2. медицинские услуги с учётом затрат на их выполнение врачебным и средним медицинским персоналом
- 3. медицинские услуги, оплачиваемые из средств ОМС
- 4. все медицинские услуги, выполняемые в учреждении здравоохранения

Правильный ответ: медицинские услуги, оплачиваемые из средств ОМС

3 Вопрос

ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА (ОФИСНОЕ) СОСТАВЛЯЕТ (В ММ РТ.СТ.)

- 1. 140/100
- 2. 135/85
- 3. 140/80
- 4. 140/90

Правильный ответ: 140/90

4 Вопрос

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ХРАНИТСЯ

- 1. в кабинете лечащего врача
- 2. у пациента

3. у главного врача

4. в регистратуре

Правильный ответ: в регистратуре

5 Вопрос

НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИ ПРИЗНАКОМ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ ____ ЭКСТРАСИСТОЛЫ

1. единичные желудочковые
2. групповые наджелудочковые

3. групповые желудочковые

4. единичные наджелудочковые

Правильный ответ: групповые желудочковые

6 Вопрос

1% ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ ПОВЫШАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ НА

1. 0,001
2. 0,002
3. 0,003

4. 0,004

Правильный ответ: 0,004

7 Вопрос

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ _____ НА ____ НАСЕЛЕНИЯ

- 1. вновь выявленных; 100 000**
2. в пересчете; 10 000
3. на конец года; 10 000
4. в пересчете; 1000

Правильный ответ: вновь выявленных; 100 000

8 Вопрос

ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. мальтофер
2. ферретаб
- 3. сорбифер**
4. тотема

Правильный ответ: сорбифер

9 Вопрос

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭОЗИНОФИЛОВ В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИ

1. ревматоидном артрите
2. стенокардии напряжения
- 3. бронхиальной астме**
4. циррозе печени

Правильный ответ: бронхиальной астме

10 Вопрос

В СОСТАВЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ЖЕНЩИН ДОМИНИРУЮТ ПО ЧИСЛЕННОСТИ

1. бифидобактерии
2. пептострептококки
3. пропионобактерии

4. лактобактерии

Правильный ответ: лактобактерии