

# Тесты | Высшее образование | Педиатрия (специалитет)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Педиатрия (специалитет) | Записей: 10

## 1 Вопрос

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ИМЕЕТ

1. микционная цистоуретрография
2. нефросцинтиграфия
3. цистоскопия
4. ультразвуковое исследование почек

**Правильный ответ: микционная цистоуретрография**

## 2 Вопрос

ВРОЖДЕННАЯ НИЗКАЯ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. появлением в прямой кишке слизистых пробок
2. рвотой желудочным содержимым
3. рвотой кишечным содержимым
4. запавшим животом

**Правильный ответ: рвотой кишечным содержимым**

## 3 Вопрос

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ АТЕЛЕКТАЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. десквамация эпителия трахеи и бронхов
2. изменение интерстициальной ткани легких
3. воспалительное поражение альвеол
4. обтурация средних и мелких бронхов

**Правильный ответ: обтурация средних и мелких бронхов**

## 4 Вопрос

В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ ОСТРОЙ СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. комбинацию седативных и неседативных антигистаминных препаратов
2. антигистаминные препараты системного действия
3. введение глюкокортикостероидов парентерально
4. антигистаминные препараты местного действия

**Правильный ответ: антигистаминные препараты системного действия**

## 5 Вопрос

ЗАНЯТИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ

1. повышение работоспособности
2. обострение хронических заболеваний
3. нарушение слуха и обоняния

**4. напряжение зрительного анализатора**

**Правильный ответ: напряжение зрительного анализатора**

## 6 Вопрос

СИНДРОМ УВЕЛИЧЕННОГО КРОВотоКА ЧЕРЕЗ ЛЁГКИЕ (ГИПЕРВОЛЕМИИ МАЛОГО КРУГА) ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. одышечно-цианотическими приступами
2. ослаблением II тона на лёгочной артерии
- 3. повторными бронхитами, пневмониями**
4. стойкой артериальной гипертонией

**Правильный ответ: повторными бронхитами, пневмониями**

## 7 Вопрос

ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕТОТРЕКСАТОМ НЕОБХОДИМО ОДНОВРЕМЕННО НАЗНАЧИТЬ

- 1. фолиевую кислоту**
2. ретинол
3. соли калия и магния
4. пиридоксин

**Правильный ответ: фолиевую кислоту**

## 8 Вопрос

ПРИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ СЛОЙ У ДЕТЕЙ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА

1. конечностях
2. животе
3. туловище
- 4. лице**

**Правильный ответ: лице**

## 9 Вопрос

АППАРАТОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. становой динамометр
2. калипер
- 3. спирометр**

4. ручной динамометр

**Правильный ответ: спирометр**

---

## 10 Вопрос

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

1. не проводится
2. проводится по желанию родителей
- 3. проводится по индивидуальному плану при достижении контроля над заболеванием**
4. проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

**Правильный ответ: проводится по индивидуальному плану при достижении контроля над заболеванием**