

Тесты | Высшее образование | Психиатрия-наркология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Психиатрия-наркология | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ НЕОБХОДИМО

- 1. письменное согласие пациента или его законного представителя**
2. устное разрешение пациента или его законного представителя
3. распоряжение органа управления здравоохранением
4. письменное согласие родственников пациента

Правильный ответ: письменное согласие пациента или его законного представителя

2 Вопрос

В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ОН НАПРАВЛЯЕТСЯ

1. в медицинскую организацию по профилю «психиатрия-наркология» для госпитализации
- 2. в кабинет медицинской профилактики или центр Здоровья**
3. на консультативный прием к врачу психиатру-наркологу или врачу психиатру-наркологу участковому
4. в медицинскую организацию по профилю «психиатрия-наркология» для амбулаторной терапии

Правильный ответ: в кабинет медицинской профилактики или центр Здоровья

3 Вопрос

ПРОФИЛАКТИКА, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ А.БАНДУРЫ И КОНЦЕПЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ РИСКА Р.ДЖЕССОРА, ОТНОСИТСЯ К ПРОГРАММЕ

1. эмоционального обучения
- 2. поведенческой модификации**
3. формирования социальных альтернатив
4. эмоционально-интерперсонального обучения

Правильный ответ: поведенческой модификации

4 Вопрос

СОДЕРЖАНИЕ КОКАИНА В МОЧЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ В ТЕЧЕНИЕ

1. 2 недель
2. 1 недели
3. 3 недель

4. 6-8 часов

Правильный ответ: 6-8 часов

5 Вопрос

ТЕСТ TLFB (TIME LINE FOLLOW BACK METHOD) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

1. диагностики употребления алкоголя с вредными последствиями
2. выявления лиц, имеющих проблемы с употреблением алкоголя
- 3. ретроспективной оценки количества потребленного алкоголя**
4. диагностики у пациентов синдрома зависимости от психоактивного вещества

Правильный ответ: ретроспективной оценки количества потребленного алкоголя

6 Вопрос

ПОД СТРАТЕГИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА СНИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ ИЛИ АЛКОГОЛИЗМОМ, ПОНИМАЮТ

1. скрининг зависимого поведения
- 2. профилактику зависимости**
3. реабилитацию
4. лечение зависимости

Правильный ответ: профилактику зависимости

7 Вопрос

К БЛОКАТОРАМ ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

1. дисульфирам
2. цитизин
3. апоморфин
- 4. налтрексон**

Правильный ответ: налтрексон

8 Вопрос

ИЗМЕНЕННОЙ ФОРМОЙ ПРОСТОГО АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, ХАРАКТЕРНОЙ ПРИ НАЛИЧИИ ЛАТЕНТНОГО ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. алкогольное опьянение с истерическими чертами
2. дисфорический вариант опьянения
- 3. алкогольное опьянение с гебефренными чертами**
4. параноидный вариант опьянения

Правильный ответ: алкогольное опьянение с гебефренными чертами

9 Вопрос

ПРИБОРОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ОПЬЯНЕНИЯ БЕЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. ареометр
2. гигрометр
3. спиртометр
- 4. алкотестер**

Правильный ответ: алкотестер

10 Вопрос

К ВАЖНЫМ СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТ

1. технологии раннего выявления склонности к употреблению психоактивных веществ
2. разработку планов психопрофилактических мероприятий
3. информирование о вреде употребления психоактивных веществ

4. обеспечение доступности комплексного обследования (медицинского, психологического)

Правильный ответ: обеспечение доступности комплексного обследования (медицинского, психологического)