



## Психиатрия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 27.08.2026, 20:00 МСК · База обновлена: 27.08.2026, 19:56 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ИСТЕРИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ ЛИЧНОСТИ СВОЙСТВЕННЫ

1. повышенная замкнутость и эмоциональная холодность
2. постоянно приподнятое настроение и тотальный оптимизм
3. тревожная мнительность и пессимизм
- ④ психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм

**Правильный ответ: 4 - психический инфантилизм, гиперэмотивность и эгоцентризм**

## Вопрос 2

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АФФЕКТ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО, СЧИТАЮТ

1. агрессивное поведение
- ② помрачение сознания
3. наличие галлюцинаций
4. компульсивное влечение к насилию и нанесению повреждений

**Правильный ответ: 2 - помрачение сознания**

## Вопрос 3

СИМПТОМЫ «ФИЗИЧЕСКОЙ АНГЕДОНИИ» ПРОЯВЛЯЮТСЯ

- ① снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению
2. нарушениями потребности в сне
3. снижением или утратой удовольствия от привычной деятельности
4. астеническим синдромом с проявлениями редукции энергетического потенциала

**Правильный ответ: 1 - снижением или утратой позитивного восприятия стимулов, имеющих отношение к пищевому и половому влечению**

## Вопрос 4

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ПАЛИПЕРИДОН НАИМЕНЬШИЙ РИСК УХУДШЕНИЯ ПРИ БЫСТРОЙ ОТМЕНЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ

1. кветиапин
2. клозапин
3. оланзапин
- ④ арипипразол

**Правильный ответ: 4 - арипипразол**

## Вопрос 5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР МИНИМИЗАЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ

1. выявление при сборе анамнеза наследственности по эндокринным заболеваниям
2. анализ средовых факторов, диагностической психиатрической категории, длительности заболевания

- 3. обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния
- 4. оценку рецепторной предпочтительности препарата

**Правильный ответ: 3 - обучение больных доступным методам самоконтроля физического состояния**

## Вопрос 6

ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ИНФАНТИЛИЗМА ХАРАКТЕРНО

- 1. грубое нарушение речевого развития
- 2. прогрессирующее течение заболевания
- 3. наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике
- 4. начало заболевания после периода нормального развития

**Правильный ответ: 3 - наличие черт «детскости» в физическом и психическом облике**

## Вопрос 7

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТОЯНСТВА СОСТАВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1. смешанного типа, включающие эклектичный состав участников и методов работы
- 2. неструктурированными, с непостоянным составом участников и неограниченной продолжительностью
- 3. открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы
- 4. полужакрытыми, с постоянным составом участников, но без фиксированной продолжительности работы

**Правильный ответ: 3 - открытыми, не иметь постоянного состава участников, без фиксированной длительности работы**

## Вопрос 8

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ РЕЗИСТЕНТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ТЕРАПИИ ДВУМЯ АНТИПСИХОТИКАМИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗИРОВКАХ В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1. 4-6
- 2. 6-8
- 3. 9-10
- 4. 2-3

**Правильный ответ: 2 - 6-8**

## Вопрос 9

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ СВЯЗАН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1. NK-лимфоцитов
- 2. В-лимфоцитов
- 3. Т-лимфоцитов

4. Фагоцитов

**Правильный ответ: 3 - Т-лимфоцитов**

**Вопрос 10**

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАСТОРМОЖЕННОСТЬ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ НЕПОСЕДЛИВОСТЬ, ОБЩАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- 1. гиперкинетического (гипердинамического синдрома)
- 2. неврозоподобного синдрома
- 3. психопатоподобного синдрома
- 4. тревожного расстройства

**Правильный ответ: 1 - гиперкинетического (гипердинамического синдрома)**