

# Тесты | Высшее образование | Психиатрия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Психиатрия | Записей: 10

## 1 Вопрос

РЕКУРРЕНТНОЕ ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ВПЕРВЫЕ ОТГРАНИЧЕНО ОТ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА В

1. МКБ-10
2. МКБ-9
3. DSM-5

### 4. DSM-4

**Правильный ответ: DSM-4**

## 2 Вопрос

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

1. имеют тенденцию к генерализации тревоги
2. проходят, если у пациента развивается деменция
3. являются нормальными атрибутами старения
4. имеют скачкообразный тип течения

**Правильный ответ: имеют тенденцию к генерализации тревоги**

## 3 Вопрос

НАИМЕНЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНОГО СИНДРОМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ СВЯЗАН С ПРИЕМОМ

1. амисульприда
2. трифлуоперазина
3. зуклопентиксола

### 4. кветиапина

**Правильный ответ: кветиапина**

## 4 Вопрос

В ОСНОВЕ ДЕЙСТВИЯ БОЛЬШИНСТВА АНТИПСИХОТИКОВ (НЕЙРОЛЕПТИКОВ) ЛЕЖИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА

1. ГАМК-рецепторы
2. дофаминовые рецепторы
3. М-холинорецепторы
4. бензодиазепиновые рецепторы

**Правильный ответ: дофаминовые рецепторы**

## 5 Вопрос

ПОЯВЛЕНИЕ ИЛИ УСИЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНЫМ ГАЛЛЮЦИНОЗОМ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ВСЛУШАТЬСЯ В ЗВУК МЕТРОНОМА ИЛИ ЧАСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СИМПТОМ

1. Ашаффенбурга
2. Липмана

### 3. Бехтерева

4. Ригера и Рейхардта

**Правильный ответ: Бехтерева**

## 6 Вопрос

СИМПТОМЫ ИДЕНТИЧНЫЕ ПАНИЧЕСКОМУ РАССТРОЙСТВУ МОГУТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ПРИ

1. идиопатическом синдроме Паркинсона
2. синдроме раздраженной кишки
3. синдроме Кандинского-Клерамбо

### 4. феохромоцитоме

**Правильный ответ: феохромоцитоме**

## 7 Вопрос

ДЛЯ ДИСЛАЛИИ ХАРАКТЕРНО

1. **неправильное звукопроизношение без нарушения других сторон речи**
2. возникновение вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга
3. сочетание с интеллектуальными нарушениями
4. возникновение вследствие нарушения мозгового кровообращения

**Правильный ответ: неправильное звукопроизношение без нарушения других сторон речи**

## 8 Вопрос

ПОД ЗАИКАНИЕМ ПОНИМАЮТ

1. полную или частичную утрату сформированной речи в результате поражения корковых речевых зон и их связей
2. нарушение речи вследствие тяжелой умственной отсталости
3. **нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное с судорогами мышц, участвующих в речевом акте**
4. нарушение произносительной стороны речи в результате поражения структур центральной или периферической нервной системы

**Правильный ответ: нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное с судорогами мышц, участвующих в речевом акте**

## 9 Вопрос

В СТАЦИОНАРЕ И ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОСМОТР ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ ПРОВОДИТСЯ

1. раз в три дня
2. каждые 12 часов

**3. ежедневно**

4. раз в два дня

**Правильный ответ: ежедневно**

---

## 10 Вопрос

ПРОТИВОПОКАЗАН К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКАХ

**1. перфеназин**

2. феназепам
3. пароксетин
4. хлорпротиксен

**Правильный ответ: перфеназин**