

# Тесты | Высшее образование | Рефлексотерапия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Рефлексотерапия | Записей: 10

## 1 Вопрос

ПРИ ОБРАЩЕНИИ РЕБЁНКА С ОСТРОЙ БОЛЬЮ В ЖИВОТЕ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

1. показана после приема анальгетиков
2. показана

**3. противопоказана**

4. показана в первые часы заболевания

**Правильный ответ: противопоказана**

## 2 Вопрос

АКУПУНКТУРНАЯ ТОЧКА V1 ЦИН-МИН НАХОДИТСЯ

1. на 1 цунь выше начала роста волос и в сторону от средней линии головы на 1,5 цуня
2. на 0,5 цуня выше начала волосистой части головы, в сторону от средней линии на 1,5 цуня

**3. кнутри от внутреннего угла глаза на 0,3 см**

4. на 0,5 цуня выше начала волосистой части головы, в сторону от средней линии на 0,6 цуня, вертикально выше начала брови

**Правильный ответ: кнутри от внутреннего угла глаза на 0,3 см**

## 3 Вопрос

ГЛУБИНА УКОЛА ТОЧКИ ШЭНЬ-ЦАН (25 R, 25 N, 25 KI) СОСТАВЛЯЕТ ДО (В САНТИМЕТРАХ)

1. 2
2. 3

**3. 1**

4. 4

**Правильный ответ: 1**

## 4 Вопрос

ТОЧКА АКУПУНКТУРЫ GB20 ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

1. сепсисе
2. боли неясной этиологии
3. артериальном кровотечении

**4. головной боли, головокружении, инсульте, нарушениях зрения**

**Правильный ответ: головной боли, головокружении, инсульте, нарушениях зрения**

## 5 Вопрос

ПРИ МЕТОДЕ ТОРМОЗНОМ, ВАРИАНТ II, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

1. игл, которые вводят медленными вращательными движениями на значительную глубину и оставляют в тканях на продолжительное время (от 30 до 60 минут и более, а иногда до нескольких часов)
- 2. игл, которые вводят медленными вращательными движениями, глубина введения игл значительная, интенсивность вызываемых ощущений - до появления легкого местного ощущения, ломоты, распираания, тяжести, без выраженной иррадиации, продолжительность оставления игл в тканях от 15 до 20 минут, число точек воздействия 4-6**
3. преимущественно с помощью одной иглы, вводимой пунктирующими движениями в кожу и подкожную клетчатку на небольшую глубину, последовательно в 8-10 точек и продолжается от нескольких секунд (10-15) до 1-2 минут, без оставления игл в тканях
4. 2-3 игл, вводимых последовательно в 6-8 точек на небольшую глубину пунктирующими движениями с кратковременным оставлением их в тканях на 3-5 минут и повторным пунктированием, сопровождающимся небольшим болевым ощущением, чувством онемения и прохождения электрического тока как локально, так и с небольшой зоной иррадиации

**Правильный ответ: игл, которые вводят медленными вращательными движениями, глубина введения игл значительная, интенсивность вызываемых ощущений - до появления легкого местного ощущения, ломоты, распираания, тяжести, без выраженной иррадиации, продолжительность оставления игл в тканях от 15 до 20 минут, число точек воздействия 4-6**

## 6 Вопрос

ТОЧКА ЦЗУ-ЛИНЬ-ЦИ (41 VB, 41 G, 41 GB) РАСПОЛОЖЕНА НА

- 1. передненаружной линии ноги**
2. второй боковой линии живота
3. тыльно-срединной линии руки
4. третьей боковой линии живота

**Правильный ответ: передненаружной линии ноги**

## 7 Вопрос

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. травматический артрит
2. спондилез
- 3. легочно-сердечная недостаточность 3 степени**
4. спондилоартроз

**Правильный ответ: легочно-сердечная недостаточность 3 степени**

## 8 Вопрос

ТОЧКА Ю-МЭНЬ (21 R, 21 N, 21 K) РАСПОЛОЖЕНА НА ОДНОМ УРОВНЕ С

1. точкой чжэ-цзинь (23 VB, 23 G, 23 GB)
2. точкой цзян-ли (11 VC, 11 JM, 11 CV)
3. точкой ши-мэнь (5 VC, 5 JM, 5 CV)

#### 4. второй точкой средней линии - цзюй-цюе

Правильный ответ: второй точкой средней линии - цзюй-цюе

### 9 Вопрос

ГЛУБИНА УКОЛА ТОЧКИ СЯНЬ-ГУ (43 E, 43 M, 43 ST) СОСТАВЛЯЕТ ДО (В САНТИМЕТРАХ)

1. 4
2. 2
3. 3
4. 1

Правильный ответ: 1

### 10 Вопрос

ТОЧКА ТЯНЬ-ЛЯО (15 TR, 15 ZE, 15 TH) РАСПОЛОЖЕНА

1. на границе нижней трети наклонной линии от точки тоу-вэй до точки сюань-ли
2. во впадине, находящейся на 1 поперечный палец кпереди от угла нижней челюсти
3. на середине расстояния между точкой цзянь-цзин и верхним краем ости лопатки
4. на средней линии спины, между остистыми отростками VI и VII шейных позвонков

Правильный ответ: на середине расстояния между точкой цзянь-цзин и верхним краем ости лопатки