

# Тесты | Высшее образование | Скорая медицинская помощь

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Скорая медицинская помощь |  
Записей: 10

## 1 Вопрос

ПОВЫШЕНИЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УРОВНЯ PЕТСO2 ДО ЗНАЧЕНИЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 15 ММ НG, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1. неудачном подборе параметров искусственной вентиляции лёгких
- 2. сохранении достаточно высоких шансов на спасение пациента**
3. снижении шансов на спасение реанимируемого пациента
4. бесперспективности дальнейших усилий по спасению пациента

**Правильный ответ: сохранении достаточно высоких шансов на спасение пациента**

## 2 Вопрос

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ МАССОВОГО ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РЯД ДЕЙСТВИЙ

1. составить список пострадавших, сообщить диспетчеру паспортные данные наиболее тяжелых пострадавших, вызвать необходимое количество медицинских бригад, передать пострадавших бригадам в строгой очередности
- 2. сообщить о случившемся диспетчеру, определить место сбора пострадавших, провести сортировку пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве и тяжести состояния пострадавших, приступить к оказанию медицинской помощи**
3. сообщить о случившемся диспетчеру, составить список пострадавших, приступить к оказанию медицинской помощи и обеспечить медицинскую эвакуацию в профильное медицинское учреждение наиболее тяжелым пострадавшим
4. приступить к оказанию медицинской помощи максимально возможному количеству пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве пострадавших, вызвать необходимое количество бригад для транспортировки

**Правильный ответ: сообщить о случившемся диспетчеру, определить место сбора пострадавших, провести сортировку пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве и тяжести состояния пострадавших, приступить к оказанию медицинской помощи**

## 3 Вопрос

ФУРУНКУЛ НОСА МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ

1. острым синуситом
2. деформацией перегородки носа
- 3. тромбозом кавернозного синуса**
4. острым ринитом

**Правильный ответ: тромбозом кавернозного синуса**

---

#### 4 Вопрос

ДЛЯ МОРФИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

1. брадикардия

**2. полиурия**

3. тошнота, рвота

4. гипотония

**Правильный ответ: полиурия**

---

#### 5 Вопрос

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИИ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ И СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. никотиновая кислота

2. анальгин

3. реланиум

**4. дроперидол**

**Правильный ответ: дроперидол**

---

#### 6 Вопрос

НАЛИЧИЕ КРЕПИТАЦИИ В ЛЁГКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОРАЖЕНИИ

**1. альвеол**

2. бронхов

3. трахеи

4. плевры

**Правильный ответ: альвеол**

---

#### 7 Вопрос

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ В ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гемосорбция

**2. промывание желудка**

3. очистительная клизма

4. форсированный диурез

**Правильный ответ: промывание желудка**

---

#### 8 Вопрос

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ КУПИРОВАНИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

**1. лидокаин**

2. ритмилен

3. пропранолол

4. этмозин

**Правильный ответ: лидокаин**

## 9 Вопрос

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ КАПНОГРАФИИ ОТ 40 ДО 50 ММ РТ.СТ. В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ (ИВЛ) ЯВЛЯЕТСЯ

1. неисправность капнографа
2. правильное проведение ИВЛ
3. гипервентиляция пациента

**4. гиповентиляция пациента**

**Правильный ответ: гиповентиляция пациента**

## 10 Вопрос

СИНДРОМ ФРЕДЕРИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1. удлинение интервала QT
2. короткий пароксизм фибрилляции желудочков
3. полную А-В блокаду с редким желудочковым ритмом

**4. сочетание полной поперечной блокады с фибрилляцией предсердий**

**Правильный ответ: сочетание полной поперечной блокады с фибрилляцией предсердий**