

Стоматология ортопедическая - кейс 1

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология ортопедическая | Записей: 1 | Кейс: 1 | Вопросов: 12

Стоматология ортопедическая - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология ортопедическая

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

На приём к врачу-стоматологу-ортопеду обратился пациент В. 32 лет.

1.2. Жалобы

на

- * скол в области переднего зуба на верхней челюсти слева,
- * эстетический дефект в области передних зубов,
- * периодически возникающие боли в области переднего зуба на верхней челюсти слева.

1.3. Анамнез заболевания

- * Скол был получен в результате травмы 5 дней назад.
- * Ранее не протезировался.
- * Последний раз стоматолога посещал 2 года назад.

1.4. Анамнез жизни

- * Со слов пациента, считает себя практически здоровым, ВИЧ, гепатит отрицает.
- * Аллергоанамнез не отягощён.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: при осмотре отмечается травма верхней и нижней губы, в полости рта отсутствует 50% коронковой части 2.1 зуба.

Зубная формула:

===	С						
	1.8 1.7	1.5	1.4 1.3 1.2 1.1	2.1 2.2 2.3 2.4	2.5 2.6 2.7 2.8	4.8 4.7	4.6 4.5
4.4 4.3 4.2 4.1	3.1 3.2	3.3 3.4	3.5 3.6	3.7 3.8	{nbsp}		

|===

Соотношение челюстей по ортогнатическому типу.

Локальный статус: 2.1 зуб имеет скол на 1/2 длины коронковой части зуба.

1. План обследования

1. Вопрос

К методу диагностики для постановки диагноза и составления плана лечения относят

1. мастикациографию
2. реопародонтографию
- 3. прицельную внутриротовую рентгенографию**
4. гнатодинамометрию

Правильный ответ: прицельную внутриротовую рентгенографию

Для оценки состояния корней, корневых каналов, периапикальных тканей, атрофии костной ткани в области присутствующих зубов. Для дифференциальной диагностики с заболеваниями периапикальных тканей.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

2. Диагноз

2. Вопрос

Наиболее вероятным диагнозом в данной клинической ситуации является

1. Обострение хронического пульпита 2.1 зуба
2. Дефект твердых тканей
3. Хронический пародонтит средней степени тяжести 2.1 зуба

4. Перелом коронки 2.1 зуба

Правильный ответ: Перелом коронки 2.1 зуба

Диагноз установлен на основании объективных клинических методов исследования (осмотр, зондирование), дополнительных рентгенологических методов исследования.

Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021

(1)

3. Вопрос

Наиболее подходящим классом в классификации по Блеку в данном случае является + ____ + класс

- 1. 4**
2. 5
3. 1
4. 2

Правильный ответ: 4

4 класс - к поражениям контактных поверхностей передних зубов присоединяется режущий край.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

3. Лечение

4. Вопрос

Тактикой ортопедического лечения на верхней челюсти у данного пациента является установка

1. мостовидного протеза
2. композитной реставрации

3. коронки

4. винира

Правильный ответ: коронки

Искусственная коронка - несъемный протез в виде колпачка, восстанавливающего анатомическую форму зуба, фиксируемого цементом на зубную культю.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

5. Вопрос

Первым клиническим этапом ортопедического лечения после проведения диагностических исследований, в данном случае, является

1. препарирование и получение оттиска
2. определение цвета будущей конструкции
3. определение центрального соотношения челюстей
4. примерка коронки

Правильный ответ: препарирование и получение оттиска

Современный протокол протезирования дефектов зубного ряда с помощью МП должен обязательно включать проведение традиционных этапов, однако проведение некоторых из них требуется рассмотреть с точки зрения новых подходов.

Прежде всего это:

- * особенности препарирования твердых тканей зубов;
- * получение двухслойного оттиска;
- * определение ЦО;
- * временное протезирование.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

6. Вопрос

Целью изготовления искусственной коронки является

1. восстановление целостности зубного ряда и предотвращение возникновения непереносимости, вызванной конструкционными материалами
2. восстановление анатомической формы и функции зуба, предупреждение развития вторичной деформации в области зубов-антагонистов
3. предупреждение развития повышенного стирания зубов-антагонистов во фронтальных и боковых отделах верхней и нижней челюстей
4. предупреждение развития функциональной перегрузки пародонта опорного зуба и прогрессирования заболеваний слизистой оболочки полости рта

Правильный ответ: восстановление анатомической формы и функции зуба, предупреждение развития вторичной деформации в области зубов-антагонистов

Искусственная коронка - несъемный протез в виде колпачка, восстанавливающего анатомическую форму зуба, фиксируемого цементом на зубную культю.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

7. Вопрос

Первым этапом препарирования под металлокерамическую коронку будет являться

1. сошлифовывание экватора вестибулярной и оральной поверхностей
2. сепарация контактных поверхностей для отделения зуба от соседних
- 3. сошлифовывание окклюзионной поверхности для разобщения с зубами-антагонистами**
4. сглаживание граней зуба

Правильный ответ: сошлифовывание окклюзионной поверхности для разобщения с зубами-антагонистами

Препарирование зубов под искусственные коронки проводится в несколько последовательных этапов.

Пропедевтика стоматологических заболеваний : учебник / О. О. Янушевич, Э. А. Базилян, А. А. Чунихин [и др.] ; под ред. О. О. Янушевича, Э. А. Базиляна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023.

(1)

8. Вопрос

Различают ____ степени подвижности зубов

1. 3
2. 5
- 3. 4**
4. 2

Правильный ответ: 4

IV степень подвижности по Энтину

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8679-5.

(1)

9. Вопрос

Субъективный метод определения цвета зубов использует

1. колорометрию
2. спектрофотометр
3. цифровой фотоанализатор
- 4. зрительный анализатор**

Правильный ответ: зрительный анализатор

Основным инструментом определения цвета зубов по-прежнему остается зрительный анализатор. Послойная структура зуба с разными тонами на разных участках, с разной насыщенностью этих тонов и светопроводимостью слоев порой ставит в тупик самых опытных врачей и зубных техников.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8680-1.

(1)

10. Вопрос

Для контроля препарирования используется

1. восковой валик
- 2. силиконовый шаблон**
3. параллелометр
4. штангенциркуль

Правильный ответ: силиконовый шаблон

Объем препарирования зуба определяют с помощью шаблона (ключа) из жесткого силикона. В зависимости от клинической ситуации ключ можно разрезать продольно, горизонтально или серийно. Полученные срезы используют для оценки степени редукции зуба

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8680-1.

(1)

11. Вопрос

Перед снятием оттисков следует осуществить

- 1. ретракцию десны**
2. нанесение компенсационного лака
3. профессиональную гигиену полости рта
4. нанесение грунтовой массы

Правильный ответ: ретракцию десны

Ретракция десны - это комплекс мер, направленных на временное изменение пространства зубодесневого желобка в вертикальном и горизонтальном направлениях за счет смещения и уменьшения объема тканей свободной десны, на снижение количества десневой жидкости и остановку капиллярного кровотечения.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8680-1.

(1)

(2)

4. Вариатив

12. Вопрос

Зоной безопасности при препарировании является

1. пришеечная область резцов нижней челюсти
2. пришеечная область клыков нижней челюсти

3. место вкола иглы при проведении анестезии

4. режущий край зуба

Правильный ответ: режущий край зуба

Зоны безопасности - участки коронок зубов, в пределах которых можно иссекать твердые ткани, не опасаясь вскрытия полости зуба.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024 г. - 416 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-8680-1.

(1)