

Тесты | Высшее образование | Стоматология (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Стоматология (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

ПРИ УДАЛЕНИИ МОЛЯРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННОЙ КОРОНКОВОЙ ЧАСТЬЮ НЕОБХОДИМО

1. провести альвеолотомию
2. наложить щёчки щипцов на альвеолярный отросток
3. провести разрез по переходной складке
- 4. разделить корни по области фуркации с помощью бора**

Правильный ответ: разделить корни по области фуркации с помощью бора

2 Вопрос

ВЫРАЖЕННОСТЬ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ

- 1. снижения высоты нижнего отдела лица**
2. хронических заболеваний слизистой оболочки
3. хронического пульпо-периодонтита
4. кариеса зуба

Правильный ответ: снижения высоты нижнего отдела лица

3 Вопрос

КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ УЧЁТА РАБОТЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТА (ФОРМА №039-2/У-88) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1. статистик
- 2. главный врач медицинской организации**
3. регистратор
4. непосредственный руководитель врача

Правильный ответ: главный врач медицинской организации

4 Вопрос

ВОЗРАСТОМ ДЕТЕЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БОЛЕЮЩИХ ОСТРЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. младший школьный
2. старший школьный
3. дошкольный
- 4. ясельный**

Правильный ответ: ясельный

5 Вопрос

АППАРАТ НАНСА ПО СПОСОБУ ФИКСАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. внеротовым
2. съёмным
3. вестибулярным

4. несъёмным

Правильный ответ: несъёмным

6 Вопрос

МАКРОПРЕПАРАТ (ИССЕЧЁННУЮ ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ) ФИКСИРУЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАСТВОРЕ

1. 5% Хлоргексидина
- 2. 10% Формалина**
3. 70% Этилового спирта
4. 1% Формалина

Правильный ответ: 10% Формалина

7 Вопрос

ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, СОСТАВЛЯЕТ

1. 20-30 месяцев
- 2. 6-8 месяцев**
3. 5-6 лет
4. 12-16 месяцев

Правильный ответ: 6-8 месяцев

8 Вопрос

ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ОСТРОМ (ОЧАГОВОМ) ПУЛЬПИТЕ

1. девитализацию пульпы
2. витальную ампутацию
- 3. сохранение жизнеспособности всей пульпы**
4. витальную экстирпацию

Правильный ответ: сохранение жизнеспособности всей пульпы

9 Вопрос

ЗАТРУДНЁННОЕ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

1. лингвоокклюзии

2. адентии

3. ретенции зубов

4. сужения верхнего зубного ряда

Правильный ответ: сужения верхнего зубного ряда

10 Вопрос

МНОГОФОРМНУЮ ЭКССУДАТИВНУЮ ЭРИТЕМУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

1. лейкоплакией

2. острым герпетическим стоматитом

3. острым псевдомембранозным кандидозом

4. поражением слизистой при кори

Правильный ответ: острым герпетическим стоматитом