

Тесты | Высшее образование | Торакальная хирургия

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Торакальная хирургия | Записей: 10

1 Вопрос

ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНОГО ТЭЛА, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ СОЧЕТАНИЕ РЕНТГЕНОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1. ЭКГ, Эхо-КГ, ангио-КТ

2. прямого измерения давления в правых отделах сердца
3. селективной ангиопульмонографии
4. ЭКГ, прямого измерения давления в легочной артерии

Правильный ответ: ЭКГ, Эхо-КГ, ангио-КТ

2 Вопрос

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЮТ

1. шигеллы
2. вирусы
3. пневмококки
4. микобактерии

Правильный ответ: пневмококки

3 Вопрос

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛОБЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЕЖЕЧАСНЫЙ ОБЪЁМ ОТДЕЛЯЕМОГО ПО ДРЕНАЖАМ ИЗ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 300 МЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2 ЧАСОВ С УЧЁТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРОБЫ РУВИЛУА-ГРЕГУАРА, ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ

1. консервативной гемостатической терапии
2. переливания свежзамороженной плазмы

3. реторакотомии

4. гемотрансфузии

Правильный ответ: реторакотомии

4 Вопрос

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ДЛИТЕЛЬНОЙ PH-МЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСЛО ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫХ РЕФЛЮКСОВ БОЛЕЕ _____ ПРОЦЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

1. 44 за сутки, времени с PH более 5 выше 2
2. 45 за сутки, времени с PH более 2 выше 3

3. 46 за сутки, времени с РН более 3 свыше 4

4. 47 за сутки, времени с РН более 4 свыше 5

Правильный ответ: 47 за сутки, времени с РН более 4 свыше 5

5 Вопрос

ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВВИДУ НАЛИЧИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ КАК ПРАВИЛО ПОКАЗАНО ВЫПОЛНИТЬ

1. среднюю трахеостомию
2. поперечную трахеостомию

3. коникотомию

4. нижнюю трахеостомию

Правильный ответ: коникотомию

6 Вопрос

ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННОЕ ЗАТЕНЕНИЕ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИНДРОМА

1. кольцевидной тени
2. милиарной диссеминации
3. облаковидной инфильтрации

4. круглой тени

Правильный ответ: круглой тени

7 Вопрос

ПОКАЗАНИЕМ К ПЕРЕРЫВУ В БУЖИРОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. развитие фибринозного эзофагита

2. боль при бужировании
3. небольшая кровоточивость
4. разрывы слизистой оболочки

Правильный ответ: развитие фибринозного эзофагита

8 Вопрос

ПРИОРИТЕТНЫМ МЕТОДОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. магнитно-резонансная томография
2. рентгеновское исследование

3. компьютерная томография

4. ультразвуковое исследование

Правильный ответ: компьютерная томография

9 Вопрос

ДЛЯ БЫСТРОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА ПРИМЕНЯЮТ

1. рентгеноскопию с контрастированием

- 2. линейную томографию
- 3. селективную ангиографию
- 4. торакоскопию

Правильный ответ: рентгеноскопию с контрастированием

10 Вопрос

В СЛУЧАЕ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЁННОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ НА УЗКОМ ОСНОВАНИИ ИЗ ТОРАКОТОМИЧЕСКОГО ДОСТУПА, ОПТИМАЛЬНЫМ ОБЪЁМОМ ОПЕРАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РАДИКАЛИЗМА, ЯВЛЯЕТСЯ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ ПУТЁМ

- 1. окончательной резекции участка бронха
- 2. клиновидной резекции участка бронха
- 3. резекции бронхолёгочного сегмента

4. бронхотомии

Правильный ответ: бронхотомии