

Тесты | Высшее образование | Трансфузиология

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Трансфузиология | Записей: 10

1 Вопрос

ДОЗУ УДАЛЯЕМОГО ФИЛЬТРАТА ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ РАССЧИТЫВАЮТ КАК

1. скорость фильтрации в минуту
2. скорость фильтрации в час
3. объем фильтрата в сутки

4. скорость фильтрации в час на кг массы тела

Правильный ответ: скорость фильтрации в час на кг массы тела

2 Вопрос

ЭТАПАМИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1. активация - адгезия - агрегация**
2. активация - агрегация - адгезия
3. агрегация - адгезия - активация
4. активация - агрегация

Правильный ответ: активация - адгезия - агрегация

3 Вопрос

НИЗКООБЪЕМНЫМ ПЛАЗМАФЕРЕЗОМ СЧИТАЮТ ПЛАЗМАФЕРЕЗ С ОБЪЕМОМ ЭКСФУЗИИ ПЛАЗМЫ ____% ОЦП

1. 70 - 150
- 2. Менее 20**
3. 50 - 70
4. 20 - 50

Правильный ответ: Менее 20

4 Вопрос

КЛЕТКАМИ КРОВИ, ПРЕЗЕНТИРУЮЩИМИ АНТИГЕНЫ, СЧИТАЮТ

1. эритроциты
- 2. макрофаги**
3. тромбоциты
4. ретикулоциты

Правильный ответ: макрофаги

5 Вопрос

ПЕРЕЛИВАНИЕ ЭРИТРОЦИТНОЙ МАССЫ В СРАВНЕНИИ С ПЕРЕЛИВАНИЕМ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ

- 1. лучше переносится больными с сердечной недостаточностью**
2. хуже переносится больными с аутоиммунными заболеваниями
3. имеет более высокий риск передачи вирусных инфекций
4. хуже переносится больными с хронической анемией и сердечной недостаточностью

Правильный ответ: лучше переносится больными с сердечной недостаточностью

6 Вопрос

НОРМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ I ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЮТ (В Г/Л)

1. 0,5 – 1
- 2. 5 – 6**
3. 3 – 4
4. 1 – 2

Правильный ответ: 5 – 6

7 Вопрос

ГЕМОСОРБЕНТ, ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮЩИЙ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОТНОСЯТ К ____ СОРБЕНТАМ

- 1. макропористым**
2. ионообменным
3. мезопористым
4. микропористым

Правильный ответ: макропористым

8 Вопрос

ПОД РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ КРОВИ ПОНИМАЮТ

1. нейтрализацию антикоагулянта на выходе из экстракорпорального контура
2. использование минимальных доз антикоагулянтов
- 3. постоянную инфузию антикоагулянта в экстракорпоральный контур**
4. контроль за концентрацией антикоагулянта в плазме крови

Правильный ответ: постоянную инфузию антикоагулянта в экстракорпоральный контур

9 Вопрос

КРОВЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ И ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

1. -25...-18

2. +20...+24

3. +10...+18

4. +2...+6

Правильный ответ: +2...+6

10 Вопрос

ГЕМОЛИЗ В КОНЦЕ ХРАНЕНИЯ ОТМЫТЫХ ЭРИТРОЦИТОВ СОСТАВЛЯЕТ _____ ЭРИТРОЦИТОВ

1. 1,8%

2. 0,9%

3. 1,5%

4. 0,8%

Правильный ответ: 0,8%