

# Тесты | Высшее образование | Ультразвуковая диагностика

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Высшее образование | Специализация: Ультразвуковая диагностика |  
Записей: 10

## 1 Вопрос

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ЛИССЭНЦЕФАЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ

1. большой цистерны
2. мозжечка
3. серпа мозга

**4. извилин полушарий мозга**

**Правильный ответ: извилин полушарий мозга**

## 2 Вопрос

ГИГАНТСКИМИ СЧИТАЮТСЯ АНЕВРИЗМЫ ДИАМЕТРОМ (В ММ)

1. <8
2. 5-8
- 3. >8**
4. 3-5

**Правильный ответ: >8**

## 3 Вопрос

ЖИДКОСТЬ В ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКЕ ПРИ АКТИВНОМ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОМ РЕФЛЮКСЕ  
МОЖНО ВЫЯВИТЬ

1. при проведении пробы с фентоламином
- 2. после мочеиспускания**
3. при проведении пробы Вальсальвы
4. до мочеиспускания

**Правильный ответ: после мочеиспускания**

## 4 Вопрос

В НОРМЕ СЕРДЦЕ ЭМБРИОНА ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ

1. трехкамерным
2. двухкамерным
- 3. четырехкамерным**
4. однокамерным

**Правильный ответ: четырехкамерным**

## 5 Вопрос

ЗНАЧЕНИЕ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА В ДИАПАЗОНЕ 0,6 - 0,4 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СОСТОЯНИИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В СТАДИИ

1. компенсации
2. компенсированной декомпенсации
3. декомпенсации

**4. субкомпенсации**

**Правильный ответ: субкомпенсации**

## 6 Вопрос

ОПТИМАЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. парастернальная позиция по короткой оси на уровне корня аорты**
2. супрастернальная длинная ось
3. парастернальная длинная ось левого желудочка
4. супрастернальная короткая ось

**Правильный ответ: парастернальная позиция по короткой оси на уровне корня аорты**

## 7 Вопрос

ДИВЕРТИКУЛ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЭХОГРАФИЧЕСКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

1. уменьшения размеров мочевого пузыря
2. наличия конкрементов в полости мочевого пузыря
- 3. незамкнутой кистозной полости, интимно соединенной с мочевым пузырем**
4. неравномерного утолщения стенок мочевого пузыря

**Правильный ответ: незамкнутой кистозной полости, интимно соединенной с мочевым пузырем**

## 8 Вопрос

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЧЕК ПЛОДА ПРИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА С \_\_\_\_ НЕДЕЛЬ

1. 20
2. 24
3. 12
- 4. 16**

**Правильный ответ: 16**

## 9 Вопрос

К ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ЖЕЛУДОЧКОВО- АРТЕРИАЛЬНОЙ ДИСКОНКОРДАНТНОСТИ ОТНОСЯТ: АНАТОМИЧЕСКИ \_\_\_\_\_ ЖЕЛУДОЧЕК СОЕДИНЯЕТСЯ С \_\_\_\_\_, АНАТОМИЧЕСКИ \_\_\_\_\_ ЖЕЛУДОЧЕК СОЕДИНЯЕТСЯ С \_\_\_\_\_

1. левый; анатомически левым предсердием; правый; анатомически правым предсердием

**2. правый; аортой; левый; легочной артерией**

3. правый; легочной артерией; левый; аортой

4. левый; анатомически правым предсердием; правый; левым предсердием

**Правильный ответ: правый; аортой; левый; легочной артерией**

---

## 10 Вопрос

ЕСЛИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ УСТАНОВЛЕН TI-RADS 4 СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ

**1. пункционную биопсию под УЗ-контролем с морфологической верификацией**

2. сцинтиграфию щитовидной железы

3. определение гормонов щитовидной железы и компьютерную томографию шеи

4. УЗ-исследование через 3-6 месяцев

**Правильный ответ: пункционную биопсию под УЗ-контролем с морфологической верификацией**