

Тесты | Среднее образование | Акушерское дело (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Акушерское дело (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

РОДЫ У ЖЕНЩИНЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В

1. родильном доме общего профиля
- 2. специализированном родильном доме**
3. эндокринном отделении стационара
4. обсервационном отделении родильного дома

Правильный ответ: специализированном родильном доме

2 Вопрос

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ _____ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР

- 1. через несколько минут**
2. через несколько часов
3. в течение суток
4. через несколько дней

Правильный ответ: через несколько минут

3 Вопрос

ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ _____ ЧАСА(ОВ)

- 1. 6-10**
2. 10-12
3. 4-6
4. 1-2

Правильный ответ: 6-10

4 Вопрос

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ В _____ РАЗМЕРЕ ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА ИЗ МАЛОГО ТАЗА

1. поперечном
- 2. прямом**
3. левом косом
4. правом косом

Правильный ответ: прямом

5 Вопрос

У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ПРОТЕКАЕТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

1. С
2. А
- 3. Е**
4. В

Правильный ответ: Е

6 Вопрос

ПРИ БИМАНУАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ

1. состояние прямой кишки
- 2. состояние внутренних половых органов**
3. степень развитости мышц брюшного пресса
4. состояние лимфоузлов

Правильный ответ: состояние внутренних половых органов

7 Вопрос

К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЭМБОЛИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ

1. отслойка плаценты
- 2. нарушение сознания**
3. нарушение мочеиспускания
4. отслойка сетчатки

Правильный ответ: нарушение сознания

8 Вопрос

ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕЗИНЫ В АВТОКЛАВЕ СТЕРИЛИЗУЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ____ ГРАДУСОВ

1. 165
- 2. 120**
3. 140
4. 135

Правильный ответ: 120

9 Вопрос

К ГРУППЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННОГО, ОТНОСЯТСЯ ПАЦИЕНТКИ С

- 1. хориоамнионитом в родах**
2. тяжелой преэклампсией
3. хроническим гастритом
4. многоплодной беременностью

Правильный ответ: хориоамнионитом в родах

10 Вопрос

РУЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРОВОДИТСЯ ПОД

1. местной инфильтрационной анестезией
2. пудендальной анестезией

3. внутривенным наркозом

4. парацервикальной анестезией

Правильный ответ: внутривенным наркозом