



Лечебное дело

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 28.08.2026, 03:25 МСК · База обновлена: 28.08.2026, 01:50 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ЖИВОТА И ВЫПАДЕНИИ ПЕТЕЛЬ КИШЕЧНИКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ

1. вправление петли кишечника в брюшную полость, асептическую повязку, госпитализацию в хирургический стационар
2. обезбоживание, наложение асептической повязки пропитанной физиологическим раствором на выпавшие петли и слабую их фиксацию к туловищу бинтом, без вправления петель кишечника в брюшную полость, инфузионную терапию, госпитализацию в хирургический стационар
3. срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных лечебных мероприятий
4. введение антибиотиков, наложение асептической повязки с охлаждением, госпитализацию в хирургический стационар

Правильный ответ: 2 - обезбоживание, наложение асептической повязки пропитанной физиологическим раствором на выпавшие петли и слабую их фиксацию к туловищу бинтом, без вправления петель кишечника в брюшную полость, инфузионную терапию, госпитализацию в хирургический стационар

Вопрос 2

РЖАВЫЙ ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1. крупозной пневмонии
2. остром бронхите
3. ОРВИ
4. бронхиальной астме

Правильный ответ: 1 - крупозной пневмонии

Вопрос 3

ДЛЯ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ХАРАКТЕРНО

1. исчезновение печеночной тупости
2. ранее вправимое грыжевое выпячивание не вправляется, резко болезненно
3. грыжевое выпячивание свободно вправляется
4. опоясывающая боль в верхней половине живота

Правильный ответ: 2 - ранее вправимое грыжевое выпячивание не вправляется, резко болезненно

Вопрос 4

АУСКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО БРОНХИТА

1. крепитацию
2. бронхиальное дыхание
3. сухие хрипы
4. шум трения плевры

Правильный ответ: 3 - сухие хрипы

Вопрос 5

КЛАССИЧЕСКАЯ ТРИАДА СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА, ВКЛЮЧАЕТ

1. тремор, отеки, одышку
2. одышку, артериальную гипертонию, обмороки
3. одышку, обмороки, стенокардию
4. стенокардию, постуральную гипотензию, отеки

Правильный ответ: 3 - одышку, обмороки, стенокардию

Вопрос 6

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1. кожно-нарывного действия
2. удушающего действия
3. общетоксического действия
4. психохимического действия

Правильный ответ: 3 - общетоксического действия

Вопрос 7

ПОЯВЛЕНИЕ РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1. пищевой токсикоинфекции
2. аневризме пищевода
3. желудочном кровотечении
4. пилоростенозе

Правильный ответ: 3 - желудочном кровотечении

Вопрос 8

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

1. боли в крестце и поясничной области
2. локальная болезненность матки, гипертонус матки
3. кровянистые выделения
4. нормальный тонус матки

Правильный ответ: 2 - локальная болезненность матки, гипертонус матки

Вопрос 9

ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ЗАПОРом ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

1. но-шпу
2. креон
3. дюфалак
4. маалокс

Правильный ответ: 3 - дюфалак

Вопрос 10

СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ТЕЛА ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАДУСАХ В ЧАС)

- 1. 1
- 2. 5
- 3. 10
- 4. 15

Правильный ответ: 1 - 1