



Рентгенология

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 19.09.2026, 19:14 МСК · База обновлена: 19.09.2026, 19:14 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ДООБСЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С

1. линейной томографии
2. рентгеноскопии
3. компьютерной рентгеновской томографии
- ④ ретроспективного изучения снятых в прошлом флюорограм

Правильный ответ: 4 - ретроспективного изучения снятых в прошлом флюорограм

Вопрос 2

ДЛЯ ВНУТРИРотовой РЕНТГЕНОГРАФИИ У ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ПАКЕТИРОВАННУЮ ПЛЕНКУ ФОРМАТОМ ___ СМ

- ① 2,2 x 3,5
2. 3,5 x 3,5
3. 2,5 x 2,5
4. 1,5 x 1,5

Правильный ответ: 1 - 2,2 x 3,5

Вопрос 3

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, СОЕДИНЯЯСЬ С ТУЛОВИЩЕМ ТОЛЬКО ОДНИМ _____ СУСТАВОМ

1. грудино-акромиальным
2. ключично-подмышечным
- ③ грудино-ключичным
4. ключично-акромиальным

Правильный ответ: 3 - грудино-ключичным

Вопрос 4

ЧТОБЫ ЗАМЕТИТЬ НЕБОЛЬШИЕ СЛАБОКОНТРАСТНЫЕ ТЕНИ МОЖНО

1. использовать источник света малой яркости
2. максимально увеличить освещенность рентгенограммы
- ③ диафрагмировать изображение
4. использовать яркий точечный источник света

Правильный ответ: 3 - диафрагмировать изображение

Вопрос 5

ЛИНЕЙНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЛЕГКИХ ПОКАЗАНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

1. эмфиземы
2. плеврального выпота
- ③ полости в туберкулезном инфильтрате
4. изменений легочного рисунка

Правильный ответ: 3 - полости в туберкулезном инфильтрате

Вопрос 6

НА ВЫСОТЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДЯТ В

1. без каких - либо ограничений
2. горизонтальном положении с барием в различных проекциях
3. вертикальном положении с барием без компрессии и пальпации
4. горизонтальном положении с контрастированием желудка воздухом

Правильный ответ: 2 - горизонтальном положении с барием в различных проекциях

Вопрос 7

ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. создание депо венозной крови
2. предотвращение токсемии
3. остановка венозного кровотечения
4. предотвращение плазмопотери

Правильный ответ: 2 - предотвращение токсемии

Вопрос 8

ПЛОСКОСТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА САГИТТАЛЬНОЙ И ФРОНТАЛЬНОЙ ГРАНИЦАМ, ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЕ СЛУХОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ И НИЖНИЕ КРАЯ ВХОДА В ГЛАЗНИЦЫ, РАЗДЕЛЯЯ ГОЛОВУ НА ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ОТДЕЛЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. краниальная
2. горизонтальная
3. медиальная
4. латеральная

Правильный ответ: 2 - горизонтальная

Вопрос 9

ПРИЗНАКОМ ЗАТРОМБИРОВАННОЙ АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. отсутствие пульсации
2. обычная пульсация
3. пульсация большой амплитуды
4. парадоксальная пульсация

Правильный ответ: 1 - отсутствие пульсации

Вопрос 10

ПРИ СЛИПЧИВОМ ПЕРИКАРДИТЕ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОБЫЗВЕЩВЛЕНИЕ В ПЕРИКАРДЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПО КОНТУРУ

1. левого предсердия
- ② правого желудочка
3. правого предсердия
4. левого желудочка

Правильный ответ: 2 - правого желудочка