

Тесты | Среднее образование | Сестринское дело в педиатрии (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Сестринское дело в педиатрии (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1. трихоцефалеза

2. энтеробиоза

3. аскаридоза

4. описторхоза

Правильный ответ: энтеробиоза

2 Вопрос

ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ИСПОЛЬЗУЮТ

1. раствор хлорида натрия

2. раствор глюкозы

3. раствор перманганата калия

4. воду

Правильный ответ: раствор хлорида натрия

3 Вопрос

РЕАКЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НА ПРОВОДИМЫЕ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ

1. через 10 минут

2. каждые 30 секунд

3. в первую и пятую минуты

4. каждую минуту

Правильный ответ: каждые 30 секунд

4 Вопрос

ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА (КРУПА) ПО ШКАЛЕ WESTLEY ЯВЛЯЕТСЯ

1. втяжение уступчивых мест грудной клетки

2. частота дыхательных движений

3. артериальное давление

4. частота сердечных сокращений

Правильный ответ: втяжение уступчивых мест грудной клетки

5 Вопрос

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ _____

1. 0-3-12
2. 0-1-12
- 3. 0-1-6**
4. 0-6-12

Правильный ответ: 0-1-6

6 Вопрос

«РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1. острой пневмонии**
2. острого плеврита
3. бронхиальной астмы
4. острого бронхита

Правильный ответ: острой пневмонии

7 Вопрос

К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ

1. легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения
2. повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3. крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения**
4. тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций

Правильный ответ: крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения

8 Вопрос

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЛИСТНУЮ ИНВАЗИЮ _____, ПРОВОДЯТ СОСКОБ С ПЕРИАНАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

- 1. энтеробиоз**
2. трихоцефалез
3. аскаридоз
4. эхинококкоз

Правильный ответ: энтеробиоз

9 Вопрос

СРЕДНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ _____ ПРОЦЕНТОВ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

1. 12-15

2. 6-8

3. 14-18

4. 1-2

Правильный ответ: 6-8

10 Вопрос

ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПАЦИЕНТКИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ПОЛОЖЕНИИ

1. сидя, руки за спиной

2. стоя с опущенными руками

3. лежа, руки вдоль туловища

4. стоя, положив руки на пояс или за голову

Правильный ответ: стоя, положив руки на пояс или за голову