

# Тесты | Среднее образование | Сестринское дело в педиатрии

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Сестринское дело в педиатрии | Записей: 10

## 1 Вопрос

ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1. трихоцефалеза

**2. энтеробиоза**

3. аскаридоза

4. описторхоза

**Правильный ответ: энтеробиоза**

## 2 Вопрос

ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ИСПОЛЬЗУЮТ

**1. раствор хлорида натрия**

2. раствор глюкозы

3. раствор перманганата калия

4. воду

**Правильный ответ: раствор хлорида натрия**

## 3 Вопрос

РЕАКЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО НА ПРОВОДИМЫЕ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ

1. через 10 минут

**2. каждые 30 секунд**

3. в первую и пятую минуты

4. каждую минуту

**Правильный ответ: каждые 30 секунд**

## 4 Вопрос

ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА (КРУПА) ПО ШКАЛЕ WESTLEY ЯВЛЯЕТСЯ

**1. втяжение уступчивых мест грудной клетки**

2. частота дыхательных движений

3. артериальное давление

4. частота сердечных сокращений

**Правильный ответ: втяжение уступчивых мест грудной клетки**

## 5 Вопрос

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ \_\_\_\_\_

1. 0-3-12
2. 0-1-12
- 3. 0-1-6**
4. 0-6-12

**Правильный ответ: 0-1-6**

## 6 Вопрос

«РЖАВЫЙ» ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1. острой пневмонии**
2. острого плеврита
3. бронхиальной астмы
4. острого бронхита

**Правильный ответ: острой пневмонии**

## 7 Вопрос

К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ

1. легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения
2. повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3. крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения**
4. тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций

**Правильный ответ: крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения**

## 8 Вопрос

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЛИСТНУЮ ИНВАЗИЮ \_\_\_\_\_, ПРОВОДЯТ СОСКОБ С ПЕРИАНАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

- 1. энтеробиоз**
2. трихоцефалез
3. аскаридоз
4. эхинококкоз

**Правильный ответ: энтеробиоз**

## 9 Вопрос

СРЕДНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ ОТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

1. 12-15

2. 6-8

3. 14-18

4. 1-2

**Правильный ответ: 6-8**

---

## 10 Вопрос

ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПАЦИЕНТКИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ПОЛОЖЕНИИ

1. сидя, руки за спиной

2. стоя с опущенными руками

3. лежа, руки вдоль туловища

**4. стоя, положив руки на пояс или за голову**

**Правильный ответ: стоя, положив руки на пояс или за голову**