

# Тесты | Среднее образование | Скорая и неотложная помощь

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Скорая и неотложная помощь |  
Записей: 10

## 1 Вопрос

САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ АБОРТОМ (ВЫКИДЫШЕМ) ЯВЛЯЕТСЯ

1. привычное невынашивание беременности
2. ранняя потеря беременности, сроком менее 12 недель
- 3. самопроизвольное прерывание беременности до достижения плодом жизнеспособного гестационного срока**
4. самопроизвольное прерывание беременности после достижения плодом жизнеспособного гестационного срока

**Правильный ответ: самопроизвольное прерывание беременности до достижения плодом жизнеспособного гестационного срока**

## 2 Вопрос

ОСТРЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ ВОЗНИКАЮТ

1. во время запоя
2. при алкоголизме первой стадии
- 3. в период абстиненции**
4. в состоянии опьянения

**Правильный ответ: в период абстиненции**

## 3 Вопрос

ХАРАКТЕР ЭКЗАНТЕМЫ ПРИ КОРИ

- 1. пятнисто-папулезный**
2. мелкоточечный
3. геморрагический звездчатый
4. везикулярный

**Правильный ответ: пятнисто-папулезный**

## 4 Вопрос

К КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ НАРУШЕННОЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ

1. тянущие боли внизу живота
2. незначительные тянущие боли без четкой локализации
- 3. вздутие, боли в животе без четкой локализации с иррадиацией в задний проход, внутреннюю поверхность бедра**

4. нарушение менструальной функции, другие вероятные признаки беременности

**Правильный ответ: вздутие, боли в животе без четкой локализации с иррадиацией в задний проход, внутреннюю поверхность бедра**

## 5 Вопрос

КЛИНИКА ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. единичными случаями
2. высокой температурой
3. гастроэнтероколитом

**4. острым, групповым началом**

**Правильный ответ: острым, групповым началом**

## 6 Вопрос

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗРЯД ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ ПОСЛЕ ЭДС НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ МИНУТ

- 1. 2-х**
2. 5-ти
3. 3-х
4. 4-х

**Правильный ответ: 2-х**

## 7 Вопрос

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ПУПОВИНЫ И МЕЛКИХ ЧАСТЕЙ ПЛОДА ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА

- 1. носилках на левом боку**
2. животе
3. правом боку
4. спине

**Правильный ответ: носилках на левом боку**

## 8 Вопрос

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ВРОЖДЕННУЮ ПНЕВМОНИЮ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ

1. паратрофии
2. перинатального поражения центральной нервной системы
3. гипотрофии

**4. бронхо-легочной дисплазии**

**Правильный ответ: бронхо-легочной дисплазии**

## 9 Вопрос

ДИАГНОЗ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОСТОЯНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА, ФОРМУЛИРУЕТСЯ У ДЕТЕЙ, ПРИ ВЫЯВЛЕННОЙ ГЛИКЕМИИ

1. 7,8 – 10,0 ммоль/л

**2. 11,1 ммоль/л и более**

3. 5,5 -6,0 ммоль/л

4. 3,1-4,5 ммоль/л

**Правильный ответ: 11,1 ммоль/л и более**

---

## 10 Вопрос

ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ

1. сидя

2. лежа на носилках горизонтально

**3. лежа на носилках с приподнятым головным концом**

4. лежа на носилках с приподнятым ножным концом

**Правильный ответ: лежа на носилках с приподнятым головным концом**